

ALLEGATO 1**SPECIE, SOTTOSPECIE, GRUPPI DI VARIETA' E DISTANZE MINIME DI COLTIVAZIONE****BUNCHING ONION (*Allium fistulosum* L.)**

Classe "Open pollination" (O.P.)	Classe "Ibridi"
Gruppo	Gruppo
Multistelo	Multistelo
Monostelo	Monostelo

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 2.000
Fra varietà appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 2.000

PORRO (*Allium porrum*)***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Per la tipologia 'Porro orientale'	
metri 1.000 in tutti i casi	
Per la tipologia 'Porro europeo'	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 2.000
metri 2.000 per le coltivazioni di sementi di pre-base e base	

RUCOLA (*Diplotaxis* spp.)***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti alla classe "O.P."	
metri 500	
Fra varietà appartenenti alle Classi "O.P." e "Ibridi"	
metri 1.000 in tutti i casi	

SPINACIO (*Spinacia oleracea*)***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti alla classe "O.P."	
metri 500	
Fra varietà appartenenti alle Classi "O.P." e "Ibridi"	
metri 1.000 in tutti i casi	

ALLEGATO 2

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI COLTIVAZIONE, DEI PROGRAMMI DI VARIAZIONE E RELATIVI CONSUNTIVI

Specie/ coltura	Tipologi a coltura	Termine presentazione programma di coltivazione	Termine presentazione programma di variazione	Termine presentazione programma consuntivo
Rucola selvatica	Annuale	16 febbraio	17 aprile	30 giugno
Porro orientale	Biennale	30 marzo	29 maggio	30 giugno
Bunching onion	Biennale	20 agosto	19 ottobre	31 marzo
Porro europeo	Biennale	20 agosto	19 ottobre	31 marzo
Spinacio	Annuale	2 ottobre	7 gennaio	30 giugno

ALLEGATO 3

SPECIE, SOTTOSPECIE, GRUPPI DI VARIETA' E DISTANZE MINIME DI COLTIVAZIONE

BARBABIETOLA – (*Beta vulgaris* L.)

Specie	Nome latino	Sottospecie	Gruppo
Barbabietola	Beta vulgaris L.	Bietola da zucchero	Monogerme
		Bietola da zucchero	Plurigerme
	Beta vulgaris L.		
		Bietola da foraggio	monogerme a radice bianca
		Bietola da foraggio	monogerme a radice gialla
		Bietola da foraggio	monogerme a radice rossa
		Bietola da foraggio	plurigerme a radice bianca
		Bietola da foraggio	plurigerme a radice gialla
		Bietola da foraggio	plurigerme a radice rossa
	Beta vulgaris L. var. conditiva Alef		
		Bietola da orto	a radice rossa piatta
		Bietola da orto	a radice rossa tonda
		Bietola da orto	a radice rossa lunga
		Bietola da orto	a radice gialla tonda
		Bietola da orto	a radice bianca tonda
	Beta vulgaris L. var. vulgaris		
		Bietola da costa	a costa bianca e foglia verde
		Bietola da costa	a costa bianca e foglia bionda
		Bietola da costa	a costa gialla foglia verde
		Bietola da costa	a costa verde foglia verde
		Bietola da taglio	a costa rossa foglia verde
		Bietola da taglio	a costa rossa foglia rossa

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

1. per le colture di sementi di categoria certificate:

Barbabietola da zucchero - per varietà appartenenti allo stesso Gruppo	
metri 1.200 se plurigermi	metri 1.200 se monogermi

Altre tipologie di Bietole - per varietà appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 600	IBRIDI = 1.000 metri

Per varietà appartenenti a gruppi diversi della stessa sottospecie	
Barbabietola da zucchero – metri 1.200	
Altre tipologie di Bietola - O.P. = metri 1.000 IBRIDI = 2.000 metri	

Per varietà appartenenti a sottospecie diverse	
O.P. = metri 1.500 IBRIDI = 2.000 metri	

Fra varietà O.P. e IBRIDI

metri 2.000

2. per colture di sementi di base e di pre-base:

per varietà plurigermi appartenenti allo stesso Gruppo
Barbabietola da zucchero – metri 1.200
Altre tipologie di Bietola - metri 1.000

Barbabietola da zucchero - per varietà appartenenti a Gruppi diversi	
Plurigermi = metri 1.200	Monogermi = metri 1.200

In tutti gli altri casi
metri 1.500

CIPOLLA – (*Allium cepa* L.)

Classe “Open pollination” (O.P.) Gruppo	Classe “Ibridi” Gruppo
a bulbo giallo tondo a giorno lungo	a bulbo giallo tondo a giorno lungo
a bulbo giallo piatto a giorno corto	a bulbo giallo piatto a giorno corto
a bulbo rosso tondo	a bulbo rosso tondo
a bulbo rosso piatto	a bulbo rosso piatto
a bulbo bianco tondo	a bulbo bianco tondo
a bulbo bianco piatto	a bulbo bianco piatto
Tipo Bianca di Lisbona	Tipo Bianca di Lisbona

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.000	IBRIDO = metri 2.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 500	IBRIDO = metri 2.000

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi con cicli diversi (<i>giorno corto vs lungo</i>)	
O.P. = metri 1.000	IBRIDO = metri 2.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi” e colture di sementi di base e pre-base	
metri 2.500 in tutti i casi	

CAVOLO – (*Brassica* L.)

Classe “Open pollination” (O.P.) e IBRIDO			
Specie	Nome latino	Sottospecie	Gruppo
Cavolo	Brassica Oleracea L. convar. Acephala DC Alef	Acephala	da foraggio

Brassica Oleracea L. convar. Acephala DC Alef var. sabellica L.		laciniato (riccio)
Brassica Oleracea L. convar. Acephala DC Alef var. botrytis L.		cavolfiore
Brassica Oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef var. cimosa Duch	Botrytis	broccolo a palla
Brassica Oleracea L. convar. Oleracea var. gemmifera DC	Bullata	di Bruxelles
Brassica Oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef var. alba DC	Capitata	cappuccio bianco
Brassica Oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef var. rubra DC		cappuccio conico
		cappuccio rosso
Brassica Oleracea L. convar. acephala (DC) Alef var. gongyloides L.	Gongyloides	rapa bianco
Brassica Oleracea L. convar. acephala (DC) Alef var. gongyloides L.	Gongyloides	rapa blu
Brassica Oleracea L. var. sabauda (L.)	Sabauda	verza

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi o a sottospecie diverse	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 2.000

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 600	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”	
metri 2.000 in tutti i casi	

ZUCCHINO – (*Cucurbita pepo* L.)

Classe “Open pollination” (O.P.) Gruppo	Classe “Ibridi” Gruppo
Pepo lungo verde scuro	Pepo lungo verde scuro
Pepo lungo verde chiaro	Pepo lungo verde chiaro
Pepo lungo striato	Pepo lungo striato
Pepo lungo bianco	Pepo lungo bianco
Pepo rotondo verde scuro	Pepo rotondo verde scuro
Pepo rotondo verde chiaro	Pepo rotondo verde chiaro

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi

O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 1.500
--------------------	----------------------

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 500	IBRIDI = metri 1.000
Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi” e colture di sementi di base e pre-base	
metri 2.000 in tutti i casi	

CAROTA – (*Daucus carota*)

Classe “Open pollination” (O.P.) Gruppo	Classe “Ibridi” Gruppo
lunga	lunga
tipo ‘Kuroda’	tipo ‘Kuroda’
mezza lunga	mezza lunga
rotonda	rotonda
da foraggio a radice viola	da foraggio a radice viola
da foraggio a radice gialla	da foraggio a radice gialla

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.200	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 600	IBRIDI = metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”	
metri 2.000 in tutti i casi	

CICORIA – (*Cichorium intybus*)

Classe “Open pollination” (O.P.) Gruppo	Classe “Ibridi” Gruppo
a foglie colorate	a foglie colorate
a foglia bionda	a foglia bionda
a foglia verde	a foglia verde
Tipo Catalogna	Tipo Catalogna
Tipo selvatiche	Tipo selvatiche
da radice	da radice

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 500	IBRIDI = metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”
metri 2.000 in tutti i casi

RAVANELLO – (*Raphanus sativus* L.)

Classe “Open pollination” (O.P.) e IBRIDI			
Specie	Nome latino	Sottospecie	Gruppo
Ravanello	<i>Raphanus sativus</i> L.	maritimus	
		oleifera	
		major	tondo bianco
		major	tondo nero
		major	mezzo lungo nero
		major	mezzo lungo rosa
		major	lungo bianco
		major	lungo nero
		major	lungo violetto
		macrocarpus (*)	da radice lungo bianco
		macrocarpus (*)	da radice mezzo lungo bianco
		macrocarpus (*)	da radice rotondo bianco
		macrocarpus (*)	da germoglio bianco
		macrocarpus (*)	da germoglio rosato
		macrocarpus (*)	da germoglio rosso
		radicula	rotondo rosso
		radicula	rotondo rosso grande punta bianca
		radicula	rotondo rosso piccola punta bianca
		radicula	ovale bianco
		radicula	ovale rosso
		radicula	mezzo lungo rosso grande punta bianca
		radicula	mezzo lungo rosso piccola punta bianca
		radicula	lungo rosso punta bianca
		radicula	lungo rosso
		radicula	lungo bianco

(*) orientali

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Fra varietà appartenenti a sottospecie diverse	
O.P. = metri 1.500	IBRIDI = metri 2.000

Fra varietà diverse appartenenti a gruppi diversi della stessa sottospecie	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso gruppo	
O.P. = metri 600	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”	
metri 2.000 in tutti i casi	

SENAPE (*Brassica juncea*)

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Fra varietà appartenenti alla Classe “O.P.”	
metri 1.000	

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”	
metri 2.000 in tutti i casi	

RAPA (*Brassica rapa*)

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Fra varietà appartenenti alla Classe “O.P.”	
metri 1.000	

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”	
metri 2.000 in tutti i casi	

Ai fini di identificare le tipologie ricomprese nell’ambito della specie Brassica Rapa, si riportano i nomi volgari (commerciali) comunemente utilizzati:

- Rapa da radice (semina primaverile ed autunnale)
- Cima di rapa (broccoletti)
- Rapa da foglie (rapini)
- Cavolo cinese da foglia e piccioli (cavolo sedano – Pack-choi)
- Cavolo cinese da testa (Pe-tsai)
- Cavolo cinese (Mibuna-Mizuna)
- Senape spinacio (Komatsuna)
- Ravizzone

SEGALE (*Secale cereale* L.)

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Tra varietà appartenenti alla Classe O.P.	
Categoria “Pre-base”	= metri 2.000
Categoria “Base”	= metri 1.000
Categoria “Certificata”	= metri 500

Tra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “IBRIDI” e tra varietà appartenenti alla Classe “IBRIDI”	
Categoria “Pre-base”	= metri 5.000
Categoria “Base”	= metri 3.000
Categoria “Certificata”	= metri 2.000

Specie non modificata

CETRIOLO – (*Cucumis sativus* L.)

Classe “Open pollination” (O.P.)	Classe “Ibridi”
Gruppo	Gruppo
Corto	Corto
Medio	Medio
Lungo	Lungo

Distanze minime di coltivazione da rispettare:

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 500	IBRIDI = metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”	
metri 2.000 in tutti i casi	