

INTEGRAZIONE ALL'ALLEGATO 10B DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2017 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA FISOLOGICA ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE DAL COSTO

All'inizio della gravidanza, possibilmente entro il primo trimestre, e comunque al primo controllo

SCREENING DEL VIRUS DELL'EPATITE B (HBV) (*)

- 91.18.6 VIRUS HBV [HBV] REFLEX. ANTIGENE HBsAg + ANTICORPI anti HBsAg + ANTICORPI anti HBcAg].
 Incluso: ANTICORPI anti HBcAg IgM se HBsAg e anti HBcAg positivi.
 Incluso: ANTIGENE HBeAg se HBsAg positivo. Incluso: ANTICORPI anti HBeAg se HBeAg negativo.
 Non associabile a 91.18.2, 91.18.3, 91.18.4 e 91.18.5

SCREENING DELL'INFEZIONE DA CYTOMEGALOVIRUS (CMV) (#)

- 91.15.F VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM
 Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie ed eventuale Immunoblotting.
 Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS

TEST PRENATALE NON INVASIVO (NIPT)

- G2.11 TEST PRENATALE NON INVASIVO (NIPT) su DNA fetale libero nel sangue materno.
 Qualunque metodo

SCREENING PER LA GONORREA (§) E DELLA CHLAMYDIA TRACHOMATIS (§)

- 90.93.3 CHLAMYDIE e NEISSERIA GONORREE RICERCA QUALITATIVA DNA.
 Incluso: estrazione, amplificazione, rilevazione. Non associabile a 90.93.C e 90.93.D", da eseguire su materiale vaginale, su quello della cervice e sulle urine;

SCREENING PER LA MALATTIA DI CHAGAS (§)

- 91.10.8 TRIPANOSOMA CRUZI ANTICORPI

SCREENING PER LA TUBERCOLOSI (§)

- 90.70.3 INTRADERMOREAZIONE CON PPD (Intradermoreazione con tubercolina secondo Mantoux)

- 90.99.1 MICOBATTERI DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DI INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE [IGRA]

(*) da offrire alle donne non precedentemente vaccinate

(#) da offrire alle donne con stato sierologico non noto o negativo

(§) da offrire solo alle gravide con fattori di rischio (vedi allegato 3)

II TRIMESTRE

Tra la 14+0 e la 23+6 settimana

SCREENING PER LA TUBERCOLOSI (^)

- 90.70.3 INTRADERMOREAZIONE CON PPD (Intradermoreazione con tubercolina secondo Mantoux)

- 90.99.1 MICOBATTERI DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DI INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE [IGRA]
-

Tra la 14+0 e la 18+6 settimana

SCREENING DELL'INFEZIONE DA CYTOMEGALOVIRUS (CMV) (+)

91.15.F VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM

Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie ed eventuale Immunoblotting.

Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS

TEST PRENATALE NON INVASIVO (NIPT) (^)

G2.11 TEST PRENATALE NON INVASIVO (NIPT) su DNA fetale libero nel sangue materno.

Qualunque metodo

(+) da offrire alle donne sieronegative ogni 4-6 settimane fino alla 23+6 sett.

(^) Solo se non eseguito precedentemente

Tra la 19+0 e la 23+6 settimana

SCREENING DELL'INFEZIONE DA CYTOMEGALOVIRUS (CMV) (+)

91.15.F VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM

Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie ed eventuale Immunoblotting.

Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS

(+) da offrire alle donne sieronegative ogni 4-6 settimane fino alla 23+6 sett.

(^) solo se non eseguito precedentemente

III TRIMESTRE

Tra la 28+0 e la 32+6 settimana

SCREENING PER LA GONORREA (§)(°) E DELLA CHLAMYDIA TRACHOMATIS (§)(°)

90.93.3 CHLAMYDIE e NEISSERIA GONORREE RICERCA QUALITATIVA DNA.

Incluso: estrazione, amplificazione, rilevazione. Non associabile a 90.93.C e 90.93.D", da eseguire su materiale vaginale, su quello della cervice e sulle urine;

SCREENING DEL VIRUS DELL'EPATITE B (HBV) (°)(*)

91.18.6 VIRUS HBV [HBV] REFLEX. ANTIGENE HBsAg + ANTICORPI anti HBsAg + ANTICORPI anti HBcAg].

Incluso: ANTICORPI anti HBcAg IgM se HBsAg e anti HBcAg positivi.

Incluso: ANTIGENE HBeAg se HBsAg positivo. Incluso: ANTICORPI anti HBeAg se HBeAg negativo.

Non associabile a 91.18.2, 91.18.3, 91.18.4 e 91.18.5

SCREENING EPATITE C (HCV)

91.19.5 VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI

Incluso: eventuale Immunoblotting.

SCREENING PER LA TUBERCOLOSI (^)

90.70.3 INTRADERMOREAZIONE CON PPD (Intradermoreazione con tubercolina secondo Mantoux)

90.99.1 MICOBATTERI DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DI INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE [IGRA]

(§) da offrire solo alle gravide con fattori di rischio (vedi allegato 3)

(°) da offrire una volta nel terzo trimestre

(*) da offrire alle donne non precedentemente vaccinate

(^) solo se non eseguito precedentemente

Tra la 33+0 e la 37+6 settimana

SCREENING PER LA GONORREA (§)(°) E DELLA CHLAMYDIA TRACHOMATIS (§)(°)

90.93.3 CHLAMYDIE e NEISSERIA GONORREE RICERCA QUALITATIVA DNA.

Incluso: estrazione, amplificazione, rilevazione. Non associabile a 90.93.C e 90.93.D", da eseguire su materiale vaginale, su quello della cervice e sulle urine;

SCREENING EPATITE C (HCV)

91.19.5 VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI

Incluso: eventuale Immunoblotting.

(§) da offrire solo alle gravide con fattori di rischio (vedi allegato 3)

(°) da offrire una volta nel terzo trimestre