

SCORE di CAPRINI*

* Lo score si applica oltre che alla Chirurgia Generale anche a tutte le chirurgie specialistiche, compresa la chirurgia ginecologica; sono invece escluse la profilassi in gravidanza e nel parto. Sono escluse anche la chirurgia neurologica, la chirurgia oculistica e la chirurgia dermatologica.

Nome Cognome..... UO.....

Ogni fattore di rischio rappresenta 1 punto

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Et  41-60 anni | <input type="checkbox"/> Edemi arti inf. |
| <input type="checkbox"/> Sovrappeso (BMI>25) | <input type="checkbox"/> Vene varicose |
| <input type="checkbox"/> Chirurgia Minore | <input type="checkbox"/> Infarto Miocardico acuto |
| <input type="checkbox"/> Sepsi (<1 mese) | <input type="checkbox"/> Scompenso cardiaco congestizio (<1 mese) |
| <input type="checkbox"/> Grave patologia polmonare inclusa polmonite (<1 mese) | <input type="checkbox"/> Patologia internistica con allettamento |
| <input type="checkbox"/> Uso di contraccettivi orali o terapia ormonale sostitutiva | <input type="checkbox"/> Storia di malattia infiammatoria intestinale cronica |
| <input type="checkbox"/> Gravidanza o puerperio (<1 mese) | <input type="checkbox"/> Pregressa chirurgia maggiore (< 1 mese) |
| <input type="checkbox"/> Storia ostetrica inspiegata di nati mortalit , aborti spontanei ricorrenti, parti prematuri associati a pre-eclampsia o ritardo di crescita fetale intrauterina. | <input type="checkbox"/> BPCO |
| | <input type="checkbox"/> Altri fattori di rischio |

SUBTOTALE:

Ogni fattore di rischio rappresenta 5 punti

- Stroke (< 1mese)
- Artroplastica elettiva degli arti inferiori
- Frattura di anca, bacino o gamba (<1 mese)
- Lesione acuta del midollo spinale (paralisi) (<1 mese)
- Trauma multiplo (<1 mese)

SUBTOTALE:

Ogni fattore di rischio rappresenta 2 punti

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Et  61-74 anni | <input type="checkbox"/> Catetere venoso centrale |
| <input type="checkbox"/> Chirurgia Artroscopica | <input type="checkbox"/> Chirurgia Maggiore (>45 min) |
| <input type="checkbox"/> Neoplasia (attiva o pregressa) | |
| <input type="checkbox"/> Chirurgia laparoscopica (>45min) | |
| <input type="checkbox"/> Paziente allettato (>72 ore) | |
| <input type="checkbox"/> Gesso immobilizzante (< 1 mese) | |

SUBTOTALE:

Ogni fattore di rischio rappresenta 3 punti

- Et  ≥75 anni
- Storia di TVP/EP
- Piastrinopenia da (HIT)
- Trombofilia congenita o acquisita
- Storia familiare di trombosi

SUBTOTALE:

PUNTEGGIO TOTALE:

Fattori di rischio emorragico

VALUTARE INDICAZIONE ALLA PROFILASSI FARMACOLOGICA E POSSIBILIT  DI FARE LA PROFILASSI CON MEZZI FISICI (calze elastiche, compressione pneumatica intermittente -CPI-) in presenza di fattori di rischio emorragico come:

- EMORRAGIA IN ATTO
- DIATESI EMORRAGICA CONGENITA (ES. MALATTIA DI WILLEBRAND, EMOFILIA) NON TRATTATA
- DIATESI EMORRAGICA ACQUISITA (ES. INSUFF. RENALE O EPATICA ACUTA O CRONICA)
- USO DI ANTICOGULANTI (ES. WARFARIN CON INR >2)
- PUNTURA LOMBARE/ANESTESIA SPINALE O EPIDURALE PREVISTE ENTRO 12 ORE
- PUNTURA LOMBARE/ANESTESIA SPINALE O EPIDURALE ESEGUITE NELLE 4 ORE PRECEDENTI
- PIASTRINOPENIA (<75 x 10⁹/l)
- IPERTENSIONE ARTERIOSA NON CONTROLLATA (230/120 mmHg o pi )

Controindicazioni all'utilizzo della CPI: grave arteriopat  periferica, scompenso cardiaco, TV superficiale

Punteggio Totale	Livello di Rischio	Incidenza di TVP (senza profilassi)	Profilassi raccomandata
0-1	Basso	2%	<input type="checkbox"/>
2	Moderato	10-20%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3-4	Alto	20-40%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 o pi�	Altissimo	40-80%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

NON si applica profilassi farmacologica del TEV per

Data: ___/___/___

Firma del Prescrittore: _____