MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA – FASE DI COLTIVAZIONE – NORME AGRONOMICHE E ALLE NORME POST-RACCOLTA

Il testo eliminato è barrato, mentre quello inserito o modificato è sottolineato.

COLTURE ARBOREE FRUTTICOLE, OLIVO DA OLIO E VITE DA VINO

In tutte le schede di coltura, il capitolo Difesa/Controllo delle infestanti è stato modificato come segue:

....

Difesa: ~~non è ammesso l'uso dei soli principi attivi, alle limitazioni d'uso previste, indicati nella tabella Difesa integrata con le limitazioni d'uso previste.~~

Gli interventi fitosanitari con fungicidi, insetticidi e acaricidi non devono superare complessivamente i valori indicati nello specifico Allegato Volumi d'irrorazione massimi in piena vegetazione.

Vincoli, indirizzi generali e consigli in "Norme Generali – **Capitolo 15 Difesa e Controllo infestanti**".

....

Il titolo della tabella dei Volumi massimi di piena vegetazione, presente nelle schede di coltura, è stato così modificata:

Volumi d'irrorazione massimi in piena vegetazione per gli interventi fitosanitari con fungicidi, insetticidi e acaricidi

Variazioni delle liste dei portinnesti consigliati delle seguenti colture:

Melo

PORTINNESTO	CLONI	ESIGENZE PEDOLOGICHE	RESISTENZA AVVERSITÀ	COMPORAMENTO AGRONOMICO
-------------	-------	----------------------	----------------------	-------------------------

Geneva® G11		Simili a M9	Tollerante al Fire Blight e a <i>Phytophthora</i> spp. (marciume del colletto); riduce i danni da gelate tardive.	Vigore leggermente superiore a M9 EMLA9
-------------	--	-------------	---	---

Variazioni delle liste varietali delle seguenti colture:

Albicocco

ENTRA	ESCE
Domino* Lido* Nelson*	Margotina* Lilly Cot* (2, 3) BO 90610010* Bora® (2)

Actinidia

ENTRA	ESCE
Ac 459 011* (Actinidia chinensis) ⁵ ZESY002* Dong – Hong* Oriental Red® (Actinidia chinensis)	Dong – Hong* Oriental Red® (Actinidia chinensis) Gold3*

Ciliegio dolce

ENTRA	ESCE
PA7UNIBO* Sweet Stephany® 13S2009* Staccato®	

Ciliegio acido

ENTRA	ESCE
Maxim®* ₃	

Melo

ENTRA	ESCE
King Spur® Fuji VW* SAN-CIV Brisset*	Buckeye® Simmons* Galaval* Sun-Civ® Fuciv52*

Pesco varietà:

Pesco polpa gialla (linea gusto tradizionale)

ENTRA	ESCE
Vistarich	Extreme® 460 PRO460* Extreme® 486 PRO486*

Pesco polpa gialla (linea gusto dolce)

ENTRA	ESCE
Extreme® 460 PRO460* Extreme® 486 PRO486*	

Pesco polpa bianca

ENTRA	ESCE
Nabby® ZAI674PB* Pamela* Maura® Zaifisan* Ophelia® ZAI685PB* Nerisa® ZAI668PB Sweetregal* Octavia® Zaigle*	Amanda® Zaibaro* Onix® Monalu* Alipersiè* Greta* Benedicte® Meydicte* Tendresse® Julie* Regalsnow® 30 - Maperla* Snow Lady* Kewina® Zaidaso* Star Princess® Braprin* Maria Delizia Ivory Sun* Gladys® Zailati*

Pesche nettarine polpa gialla

ENTRA	ESCE
Najiasia Extreme® 615 - PRO615*	

Pesche nettarine piatte

ENTRA	ESCE
Cakedrim* Nectacake® Cakebuzz* Nectacake® Cakerumba* Nectacake® Cakediva* Nectacake®	

Susino varietà:**Susino cino-giapponese**

ENTRA	ESCE
	Mtis® Blockred VI* Metis® 1C116

COLTURE ERBACEE

In tutte le schede di coltura, il capitolo Difesa/Controllo delle infestanti è stato modificato come segue:

....

Controllo infestanti: ~~non~~ **è ammesso l'uso dei soli l'impiego di principi attivi e di dosi diverse indicati nella tabella Controllo integrato delle infestanti con le limitazioni d'uso previste.**

Difesa: ~~non~~ **è ammesso l'uso dei soli principi attivi, alle limitazioni d'uso previste, indicati nella tabella Difesa integrata con le limitazioni d'uso previste.**

...

I volumi massimi in piena vegetazione per gli interventi fitosanitari con fungicidi, insetticidi e acaricidi di prodotti fitosanitari non devono superare complessivamente i ...

Per le colture girasole, graminacee foraggere, orzo, favino e sorgo il capitolo Difesa/Controllo delle infestanti è stato modificato come segue:

....

I volumi massimi in piena vegetazione per gli interventi fitosanitari con erbicidi non devono superare complessivamente i valori indicati nelle Norme generali generali di prodotti fitosanitari non devono superare complessivamente i ...

Per le colture: avena, farro, colza, barbabietola, frumento, girasole, mais, orzo, segale, sorgo, triticale; nella scheda Dose standard N-P-K la nota decrementi è stata integrata come segue:

....

40 kg: negli altri casi di precessione di prati a leguminose o misti.

In NTA di Erba Medica e graminacee foraggere seguito delle verifiche fatte sull'ultima edizione del Catalogo varietale UE e successivi complementi datati fino al 31/08/21, sono state aggiornate schede varietali A e B

Erba medica

...

LISTA A					
VARIETÀ	ANNO DI ISCRIZIONE	COSTITUTTORE E RESPONSABILE DELLA SELEZIONE CONSERVATRICE	DITTA FORNITRICE	PRODUTTIVITÀ (1)	LONGEVITÀ
4 Cascine	1992	Bernardo Cella (San Giorgio in Piano - PC)	SIVAM	Buona	Elevata
Azzurra	2003	S.I.S. Società Italiana Sementi	S.I.S. Società Italiana Sementi	Elevata	Buona
Classe	1997	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi	Media	Buona
Delta	1970	S.I.S. - Società Italiana Sementi	S.I.S. - Società Italiana Sementi	Buona	Buona
Garisenda	1976	S.I.S. - Società Italiana Sementi	S.I.S. - Società Italiana Sementi	Elevata	Elevata
Gea	1992	Roberto Guarnieri (Traversetolo - PR)	Continental Semences	Media	Buona
Iside	1994	Istituto Sperimentale Colture Foraggere (Lodi)	Pasini Franco	Buona	Buona
Isola	2001	Apsovsementi	Apsovsementi	Media	Buona
La Torre	1994	Apsovsementi	Apsovsementi	Buona	Buona
Letizia	1998	Compagnia Generale Servizi	Compagnia Generale Servizi	Buona	Buona
Minerva	2004	Società Produttori Sementi Bologna <u>Milano</u>	Società Produttori Sementi Bologna <u>Milano</u>	Media	Media
PR57N02	1999	Pioneer Hi-Bred - Usa	Pioneer Hi-Bred - Italia	Elevata	Buona
Prosementi Bologna	1973	Società Produttori Sementi Bologna <u>Milano</u>	Società Produttori Sementi Bologna <u>Milano</u>	Elevata	Molto Elevata
Robot	1978	Istituto Sperimentale Colture Foraggere (Lodi)	S.I.S. - Società Italiana Sementi	Buona	Elevata
Triade	1990	C.M.G.P.A.	Limagrain Italia	Media	Buona

(Tombolo, Padova)

LISTA B

VARIETÀ	ANNO DI ISCRIZIONE	COSTITUTTORE E RESPONSABILE DELLA SELEZIONE CONSERVATRICE	DITTA FORNITRICE	PRODUTTIVITÀ (1)	LONGEVITÀ
Equipe	1978	Istituto Sperimentale Colture Foraggere (Lodi)	S.I.S. - Società Italiana Sementi	Media	Buona
Gamma	1998	Istituto Sperimentale Colture Foraggere (Lodi)	Agroservice	Media	Media
Gigante Romea	1995	Ancarani Pasquale	Ancarani Pasquale	Media	Buona
Hystory	1999	Forage Genetics (U.S.A.)	Limagrain Italia	Inferiore alla media	Buona
Legend	1993	Land o' Lakes Inc. (Minnesota, U.S.A.)	Pasini Franco	Inferiore alla media	Buona
Pomposa	1992	Gennari & Schiavi (Migliaro, Ferrara)	SeFoBi	Media	Buona

Graminacee e foraggere

...

CULTIVAR (1)	ANNO DI ISCRIZIONE	PLOIDIA (2)	TIPO (3)	ALTERNATIVITÀ (4)	EPOCA DI SPIGATURA	PRODUTTIVITÀ (5)	PROVE (N.)	DITTA FORNITRICE
Lemnos	1992	T	W	A	Tardiva	Elevata	20	Apsovsementi
Lilio	1998	T	W	A	Medio-precocce	Media	16	CSG Sementi spa
Lolan	2005	T	I	A	Tardiva	Elevata	9	DLF -Trifolium
Sabrese	2001	T	W	A	Medio-tardiva	Elevata	18	Sivam spa

Tauro	1998	T	W	N	Medio-tardiva	Media	18	Sun Company
-------	------	---	---	---	---------------	-------	----	-------------

Variazioni delle liste varietali delle seguenti colture:

Erba medica

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
	Hystory	
Minerva		Aggiornato costituutore e responsabile della ditta fornitrice
Prosementi		Aggiornata con Prosementi Bologna

Frumento tenero

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
Filon		

Frumento duro

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
Antalis Marco Aurelio RGT Natur		

Girasole

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
Biloba CLP(2)		(1) Linoleico - tradizionale (2) Oleico

Graminacee e Foraggere

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
	Sabroso	

Mais

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
P1049 DKC6492 Kulmos SY Fuerza Elektro		

Orzo

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
Alastro Lg capricorn Maltesse Spazio Orione Amistar		

Futura Kws tonic Lg zebra Rafaela		
--	--	--

soia

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
Ekam (1+) KWS Annika (1) SY Victorious (1+)		Tra parentesi la classe di maturazione

sorgo

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
Arcane Araldo Armida RGT Aliggator		

COLTURE ORTIVE

In tutte le schede di coltura, il capitolo Difesa/Controllo delle infestanti è stato modificato come segue:

....

Controllo infestanti: ***non è ammesso l'uso dei soli principi attivi e di dosi diverse indicati nella tabella Controllo integrato delle infestanti con le limitazioni d'uso previste.***

Difesa: ~~non~~ **è ammesso l'uso dei soli principi attivi, alle limitazioni d'uso previste, indicati nella tabella Difesa integrata con le limitazioni d'uso previste.**

...

I volumi massimi in piena vegetazione per gli interventi fitosanitari con fungicidi, insetticidi e acaricidi di prodotti fitosanitari non devono superare complessivamente i ...

Per le orticole Bietola da costa e da foglie, Cicorie, Endivie e Radicchi, Rucola e Spinacio sono state apportate le seguenti modifiche redazionali: nelle schede dose standard N-P-K è stata cancellata la denominazione APPORTI DA TAGLIO e mantenuta per le sole fertilizzazioni azotate la quota aggiuntiva per i tagli successivi; sono stati inoltre uniformato i titoli nel caso di Bietola da costa e da foglie ;

per la coltura pomodoro a pieno campo l'allegato fitoregolatori è stato modificato come segue:

COLTURA	Tipo impiego	S.A.	Dosaggio	Epoche di trattamento	Indicazioni d'uso
Pomodoro a pieno campo	Maturante	Etefon	da etichetta	730 gg prima della raccolta	<p>I trattamenti possono essere effettuati entro il 5 agosto e dopo il 5 settembre allo scopo di agevolare la pianificazione e le operazioni di raccolta. Il dosaggio varia in funzione dello sviluppo vegetativo della pianta e delle condizioni climatiche e non deve mai superare le indicazioni in etichetta. Il trattamento va eseguito in una o due soluzioni avendo cura di trattare nelle ore fresche della giornata con elevati volumi (10-12 q/ha).</p> <p><u>In condizioni climatiche avverse nei 30 gg precedenti la raccolta. Solo pomodoro destinato all'industria</u></p>

Per la coltura Porro è stata definita la restituzione idrica giornaliera ed i volumi di adacquata massimi come segue:

I criteri e le modalità che sono la base della pratica irrigua in un sistema agricolo a produzione integrata sono illustrati in modo esaustivo nella parte generale del disciplinare. In questa sede sono riportate le tabelle specifiche relativamente alla definizione delle quantità d'acqua necessaria al regolare sviluppo della coltura (tab. 1), al volume massimo di acqua da distribuire in ogni intervento (tab. 2).

La coltura è divisa in due tipologie: trapianto invernale (con raccolta estiva), trapianto estivo (con raccolta autunnale)

Tab.1 Trapianto invernale tabella dei consumi giornalieri espressi in millimetri/giorno

1Fenofase	Restituzione idrica mm/giorno	irrigazione
Trapianto	2,2	Ammessa
10 foglie	3,4	Ammessa
15 foglie	4,6	Ammessa
17 foglie	4,05	Ammessa
> 17 foglie	2,3	Ammessa
Raccolta	-	-

Tab.1 Trapianto estivo tabella dei consumi giornalieri espressi in millimetri/giorno

2Fenofase	Restituzione idrica mm/giorno	irrigazione
Trapianto	1,0	Ammessa
10 foglie	2,0	Ammessa

15 foglie	3,6	Ammessa
17 foglie	4,4	Ammessa
> 17 foglie	4,0	Ammessa
Raccolta	-	-

Non ammesso superare i volumi indicati nella tabella 3. Questa tabella non è idonea alla determinazione di volumi irrigui per la microirrigazione.

Tabella 3 dei volumi massimi di intervento (mm).

		ARGILLA %												
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
S A B B I A	0	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	37	38	38
	5	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39
	10	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38
	15	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36
	20	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35
	25	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33
	30	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32
	35	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	-
	40	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	-	-
	45	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	-	-	-
%	50	20	20	21	21	22	22	23	23	24	-	-	-	-

55	18	19	19	20	20	21	21	22	-	-	-	-	-
60	17	17	18	18	19	19	20	-	-	-	-	-	-
65	15	16	16	17	17	18	-	-	-	-	-	-	-
70	14	14	15	15	16	-	-	-	-	-	-	-	-

Per le colture sotto riportate in tabella, le schede dose standard N-P-K sono state modificate come da tabella:

COLTURA	Produzione	Modifica		
		N (kg/ha)	P (kg/ha)	K (kg/ha)
Basilico	Alta		100	
			80	
			<u>60</u>	
Bietola	Media		120	
			100	
			<u>40</u>	
Bietola	Alta		120	245
			100	175
			<u>50</u>	<u>70</u>

Cetriolo	Alta		<u>220</u>	300
			<u>120</u>	250
			<u>70</u>	<u>170</u>
Cicoria mercato fresco	Alta			210
				150
				<u>100</u>
Cavolfiore	Alta		120	230
			80	180
			<u>50</u>	<u>80</u>
Cavolo Broccolo	Alta		120	150
			80	130
			<u>50</u>	<u>70</u>
Cavolo Cappuccio	Alta		120	230
			80	180
			<u>40</u>	<u>80</u>
Cavolo Verza	Alta		120	220
			90	180
			<u>40</u>	<u>80</u>
Cavolo Riccio, Cavolo Nero, Cime di Rapa	Media=Alta		120	120
			80	100
			<u>50</u>	<u>70</u>
Melanzana (pieno campo)	Media=Alta			300
				250
				<u>150</u>
Melanzana (serra)	Media=Alta			300
				300
				<u>200</u>
Peperone	Alta		<u>170</u>	300
			<u>90</u>	275
			<u>60</u>	<u>180</u>

Prezzemolo	Alta		<u>130</u>	
			<u>80</u>	
			<u>60</u>	
Spinacio	Alta	<u>190</u>		
Zucchini (mercato fresco)	Alta		<u>170</u>	260
			<u>120</u>	210
			<u>80</u>	<u>120</u>
Zucchini (da industria)	Alta		190	260
			150	210
			<u>80</u>	<u>120</u>

Per la coltura cipolla è stata introdotta una nuova scheda dose standard relativa all'alta produzione, come segue:

CIPOLLA Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

<u>Note decrementi</u>	<u>Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 55-75 t/ha:</u>	<u>Note incrementi</u>
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:		Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere

(barrare le opzioni adottate)	<u>DOSE STANDARD: 180 kg/ha di N</u>	alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: <u>50 kg/ha:</u> (barrare le opzioni adottate)
☐ <u>30 kg:</u> se si prevedono produzioni inferiori 55 t/ha; ☐ <u>20 kg:</u> in caso di apporto di ammendante alla precessione; ☐ <u>20 kg:</u> in caso di elevata dotazione di sostanza organica; ☐ <u>15 kg:</u> in caso di successione a leguminosa annuale.		☐ <u>30 kg:</u> se si prevedono produzioni superiori a 75 t/ha; ☐ <u>20 kg:</u> in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ <u>30 kg:</u> in caso di successione ad un cereale con paglia interrata; ☐ <u>15 kg:</u> in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio); ☐ <u>20 kg:</u> in presenza di terreni poco aerati e/o compattati (difficoltà di approfondimento dell'apparato radicale).

CIPOLLA Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO

<p align="center"><u>Note decrementi</u></p> <p>Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard:</p> <p align="center">(barrare le opzioni adottate)</p>	<p>Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 55-75 t/ha:</p> <p align="center"><u>DOSE STANDARD</u></p>	<p align="center"><u>Note incrementi</u></p> <p>Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:</p> <p align="center">(barrare le opzioni adottate)</p>
<p>☐ 15 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 55 t/ha.</p>	<p>90 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;</p> <p>160 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;</p> <p>70 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.</p>	<p>☐ 15 kg: se si prevedono produzioni superiori a 75 t/ha;</p> <p>☐ 10 kg: in caso di basso tenore di sostanza organica nel suolo;</p> <p>☐ 15 kg: per semine effettuate prima del 15 marzo.</p>

CIPOLLA Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO

<p align="center"><u>Note decrementi</u></p> <p>Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard:</p> <p align="center">(barrare le opzioni adottate)</p>	<p>Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 55 - 75 t/ha:</p> <p align="center"><u>DOSE STANDARD</u></p>	<p align="center"><u>Note incrementi</u></p> <p>Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:</p> <p align="center">(barrare le opzioni adottate)</p>
<p>☐ 25 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 55 t/ha.</p>	<p>180 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;</p> <p>230 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;</p> <p>90 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.</p>	<p>☐ 25 kg: se si prevedono produzioni superiori a 75 t/ha.</p>

Variazioni delle liste varietali delle seguenti colture:

Anguria

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
Bahama (Syngenta) Black Passion (Lambo Seeds) Bottle Rocket (Seminis) Sweet Candy (Esasem)		Senza semi buccia nera(Pieno campo) Senza semi buccia nera (serra, tunnellino) Crimson senza semi (tunnellino) Tipologia MINI

Basilico

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
Prospera F1 (Fenix)		

Bietola da costa e da foglia

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
PRIUS (Pop Vriend Seeds) SIBILLA (SAIS)		Bietola verde da taglio Bietola da costa

Carota

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
--------------	-------------	-------------

Namibia (Bejo) Narvik F1(Bejo) Suenio (Vilmorin)	Finley	Mercato fresco (Tipologia Nantese) Mercato fresco (Tipologia Nantese) Mercato fresco (Tipologia Nantese)
--	--------	--

Cavoli

Cavolfiore

Entra	Esce	Note
Lucex (Seminis) Marmorex (Seminis) Subasio(Seminis)		

Cavolo verza

Entra	Esce	Note
Deuce (Clause) Firensa (Beyo) Nebraska (Syngenta)		

Cetriolo

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
		Two Bittes errata corrige con Two Bites (Meridiam Seeds)

Cicoria

Cicoria a foglie colorate

Entra	Esce	Note
VIVALDI (Bejo)		Cicoria a foglie colorate

Cipolla

Bulbo giallo

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
	Sonoma	Errata corrige - La varietà Moondance F1 (Bejo) riportata nella tipologia a giorno corto va inserita nella tipologia bulbo giallo (giorno lungo) Nota: Varietà Sonoma errata corrige Sonoma F1 (Bejo).

Fagiolino

Industria

Entra	Esce	Note
Aldrin	Pike Schubert Sydney	

Mercato fresco

Entra	Esce	Note
-------	------	------

Maserati	Belcampo Momentum SV1545	
----------	--------------------------------	--

Finocchio

<u>Entra</u>	<u>Esce</u>	<u>Note</u>
VELINO –(BEJO)	Orbit	ENEA (Cora seeds) (EX CRX 12228)

Lattuga

Romana

Entra	Esce	Note
Quipus (41-119) RZ		

Gentilina e Betavia

Entra	Esce	Note
Gonzaga (Gautier) Imanis (Gautier) Meglion (RZwann) Afabila (Enza Zaden)	Agribel Bataille Fuzila Guardie Golrac	

Cappuccio p.c. estate

Entra	Esce	Note
	1178	

Cappuccio p.c. primavera

Entra	Esce	Note
Analotta (Enza Zaden) Gaudenti F1(Vilmorin)		

Cappuccio per c.p.

Entra	Esce	Note
		Capuccina varietà Rivalta errata corrigi RIVALDA(RZ)

Mais dolce

Entra	Esce	Note
GSS14184 GSS5613R HMX832 Solitaire ZHI32780Y	Bullion GSS 8529 M Kwondo Kuatour Sweet Star	Super dolci

Melanzana

Entra	Esce	Note
BARBARELLA (Semencoop)		

Melone

Melone in coltura semiforzata

Entra	Esce	Note
Graffio (Clause)		

Patata

Entra	Esce	Note
Allison Bernice Prince Sifra Sunita	Alverstone Dirosso	Pasta bianca buccia gialla Pasta e buccia gialla Pasta bianca e buccia gialla Pasta bianca Pasta gialla Nota : Alverston Russet * errata corrigge Alverstone Russet * Nota :Leonata* errata corrigge Leonata* KWS

Pisello

Industria

Entra	Esce	Note
BINGO	Infinity	<u>Da industria</u>
Expo	Larex	<u>Da industria</u>
IDALGO	Newton	<u>Da industria</u>
LOGAN		<u>Da industria</u>
Prelado		<u>Da industria</u>
Saltingo		<u>Da industria</u>
Smart		<u>Da industria</u>
SAVANNAH		<u>Da industria</u>
STAMPEDE		<u>Da industria</u>
STILE		<u>Da industria</u>
TOMAHWAK		<u>Da industria</u>

Pomodoro da mensa

Pomodoro cherry e datterino

Entra	Esce	Note
		Datterino varietà Chikito errata corrige CIKITO (Monsanto Vegetable Seeds)

Pomodoro raccolto a bacca inviata

Allungato

Entra	Esce	Note
MR GREEN (Tsi Italia)		
ZENO (Esasem)		
KOKORO (Unigen)		

Pomodoro da industria

Entra	Esce	Note
ALEATICO	BURDALO	Concentrato e altre destinazioni
CAPIROSSO	JAG8810	Concentrato e altre destinazioni
EDIMAR	KENDRAS	Concentrato e altre destinazioni
ERCOLE	NUN00287 TOP	Concentrato e altre destinazioni
HEINZ 2306	NUN 283	Concentrato e altre destinazioni
ISI 28302	NUN 505	Concentrato e altre destinazioni
KANT	QUICKFIRE	Concentrato e altre destinazioni
LIVIO	RED VALLEY	Concentrato e altre destinazioni
NUN 510	UG 124	Concentrato e altre destinazioni
UG 298	CARTER	Concentrato e altre destinazioni
UG 8168	DRES	Concentrato e altre destinazioni
UG 84914	REGEN	Concentrato e altre destinazioni
SOLEREX		Allungato
HEINZ 2021		Allungato
HEINZ 1421		Allungato
HEINZ 2127		Allungato
HMC 147		Allungato
SV5197		Allungato

Porro

Entra	Esce	Note
Laston F1 (BASF-Nunhems)		Segmento inverno
Linkton F1 (BASF-Nunhems)		Segmento Prepack - Estivo
Shafton F (BASF-Nunhems)		Segmento estivo
Porbella (Incao seeds)		Segmento inverno

sedano

Entra	Esce	Note
Tejal RZ f1 (49-13)	Utah 5270 R	

Spinacio

Industria

Entra	Esce	Note
Accordion (Pop Vried)	Caladonia	<u>Industria</u>
Bilby (Rijk Zwaan)	Clarinet	<u>Industria</u>
Blobfish (Rijk Zwaan)	Falcon	<u>Industria</u>
El Giga (Syngenta)	Mississippi	<u>Industria</u>
Fagot (Pop Vried)	Monterey	<u>Industria</u>
Serow (Rijk Zwaan)	Monza	<u>Industria</u>
Timor (Bayer/Monsanto)	Novico	<u>Industria</u>
	Sparrow	
		<u>Nota:</u> Silver Wale errata corrige <u>Silverwhale (RZ)</u>

Zucchini

Chiari

Entra	Esce	Note
Oriente F1(L'ortolano)		

Scuri

Entra	Esce	Note
Noah (Esasem)	Mikonos	
Paros (Syngenta)		

COLTURE BABY LEAF (IV GAMMA)

In tutte le schede di coltura, il capitolo Difesa/Controllo delle infestanti è stato modificato come segue:

....

Controllo infestanti: ~~non è ammesso l'uso dei soli principi attivi e di dosi diverse indicati nella tabella~~ **Controllo integrato delle infestanti con le limitazioni d'uso previste.**

Difesa: ~~non è ammesso l'uso dei soli principi attivi, alle limitazioni d'uso previste, indicati nella tabella~~ **Difesa integrata con le limitazioni d'uso previste.**

...

I volumi massimi in piena vegetazione per gli interventi fitosanitari con fungicidi, insetticidi e acaricidi di prodotti fitosanitari non devono superare complessivamente i ...

NORME POST RACCOLTA

Inserimento del principio attivo fenhexamid, nel disciplinare di produzione integrata, come trattamento per la fase di post raccolta per le seguenti colture: albicocco, ciliegio, pesco e susino (nel disciplinare frutticole prodotto fresco) così come segue:

DISCIPLINARE POST RACCOLTA FRUTTICOLE PRODOTTO FRESCO:

ALBICOCCO

2.b.4 - Difesa post-raccolta

~~In base alle norme vigenti non sono autorizzati interventi in post-raccolta con prodotti chimici~~

....

I principi attivi autorizzati e gli intervalli di sicurezza, in riferimento alle diverse malattie, sono riportati nella tabella seguente.

Tab. 2: Trattamenti post-raccolta dell'albicocco⁽¹⁾

<u>p.a.</u>	<u>t.c.</u> <u>gg</u>	<u>r.m.a</u> <u>ppm</u>	<u>Patogeni e malattie</u>	<u>Cultivar</u>
<u>Fenhexamid</u> ⁽²⁾	<u>1</u>	<u>10</u>	<u><i>Botrytis cinerea, Monilia spp</i></u>	<u>Varie</u>

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

(2) Fenhexamid non può essere utilizzato in post-raccolta se è già stato usato in pre-raccolta, indipendentemente dal numero di interventi eseguiti in pre-raccolta

....

CILIEGIO

2.d.4 - Difesa post-raccolta

....

Tab. 2: Trattamenti post-raccolta del ciliegio ⁽¹⁾

p.a.	t.c. gg	r.m.a ppm	Patogeni e malattie	Cultivar
Fludioxonil	-	5	<i>Botrytis cinerea, Monilia spp., Rhizopus spp.</i>	Varie
<u>Fenhexamid</u> ⁽²⁾	<u>1</u>	<u>7</u>	<u><i>Botrytis cinerea, Monilia spp</i></u>	<u>Varie</u>

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

(2) Fenhexamid non può essere utilizzato in post-raccolta se è già stato usato in pre-raccolta, indipendentemente dal numero di interventi eseguiti in pre-raccolta

....

PESCO

2.i.4 - Difesa post-raccolta

....

Tab. 2.1: Trattamenti post-raccolta delle pesche ⁽¹⁾

p.a.	t.c. gg	r.m.a. ppm	Patogeni e malattie	Cultivar
Fludioxonil	-	5	<i>Botrytis, Monilia</i>	Varie
Pyrimethanil + Olio di Garofano	-	15	<i>Botrytis, Monilia</i>	Varie
<u>Fenhexamid</u> ⁽²⁾	<u>1</u>	<u>10</u>	<u><i>Botrytis, Monilia</i></u>	<u>Varie</u>

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

(2) Fenhexamid non può essere utilizzato in post-raccolta se è già stato usato in pre-raccolta, indipendentemente dal numero di interventi eseguiti in pre-raccolta.

SUSINO

2.1.4 - Difesa post-raccolta

.....

Tab. 2: Trattamenti post-raccolta della varietà di susino ⁽¹⁾

p.a.	t.c. gg	r.m.a. ppm	Patogeni e malattie	Cultivar
-------------	--------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

1-MCP	-	0,01	Senescenza	Varie
Fludioxonil	-	5	<i>Botrytis, Penicillium, Colletotrichum</i>	Varie
<u>Fenhexamid</u> ⁽²⁾	<u>1</u>	<u>2</u>	<u><i>Botrytis, Monilia</i></u>	<u>Varie</u>

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

(2) Fenhexamid non può essere utilizzato in post-raccolta se è già stato usato in pre-raccolta, indipendentemente dal numero di interventi eseguiti in pre-raccolta.