

TABELLE DI ESPLICITAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Tabella 1: Sottogruppi di popolazioni definibili secondo specifiche categorie di rischio per HCV
Uso di droghe iniettabili (anche un solo episodio);
Pazienti sottoposti ad emodialisi;
Pazienti con transaminasi ALT (o GPT) elevata;
Soggetti trasfusi con concentrati di fattori della coagulazione prima del 1987;
Soggetti trasfusi con componenti del sangue o trapiantati con organi solidi prima del 1992;
Soggetti esposti a sangue di individui HCV positivi o di individui ad alto rischio di essere HCV positivi;
Nati da madri HCV-RNA positive;
Conviventi di soggetti HCV positivi.

Tabella 2: Fattori di rischio per le infezioni sessualmente trasmesse (IST)
Contatto sessuale con persona o persone con riconosciuta IST;
Età ≤ 25 anni in persona sessualmente attiva;
Un nuovo partner sessuale o più di due partner sessuali nel corso dell'anno precedente;
Persona attualmente monogama, che ha avuto in passato più relazioni anche monogamiche;
Nessuna contraccezione o utilizzo esclusivo di metodi contraccettivi non di barriera (per esempio contraccettivi orali o dispositivo intrauterino);
Abuso di alcol o assunzione di sostanze chimiche (per esempio, marijuana, cocaina, ecstasy, metanfetamina), soprattutto se associato ad attività sessuale;
Pratiche sessuali non sicure (per es. sesso non protetto orale, genitale o anale; sesso con contaminazione ematica, compreso sadomasochismo, condivisione di oggettistica erotica);
Prostituzione e clienti di prostitute/i;
Sesso di sopravvivenza: lo scambio di sesso per soldi, droga, un riparo o cibo;
Vita di strada, senza fissa dimora;
Partner sessuale anonimo (per esempio conosciuto in internet, rave party);
Vittima di violenza sessuale/abuso;
Precedente IST.

Tabella 3: Fattori di rischio per il diabete gestazionale a 16-18 settimane
Diabete gestazionale in una gravidanza precedente;
Indice di massa corporea (IMC) pregravidico ≥ 30 kg/m ² ;
Riscontro, precedentemente o all'inizio della gravidanza, di valori della glicemia plasmatica compresi fra 100 e 125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l);

Tabella 4: Fattori di rischio per il diabete gestazionale a 24-28 settimane
Età ≥ 35 anni;
Indice di massa corporea (IMC) pregravidico ≥ 25 kg/m ² ;
Riscontro, precedentemente o all'inizio della gravidanza, di valori della glicemia plasmatica compresi fra 100 e 125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l);
Macrosomia fetale in una gravidanza precedente ($\geq 4,5$ kg)
Diabete gestazionale in una gravidanza precedente (anche se con determinazione normale a 16-18 settimane)
Anamnesi familiare di diabete (parente di primo grado con diabete tipo 2)
Famiglia originaria di aree ad alta prevalenza di diabete: Asia meridionale (in particolare India, Pakistan, Bangladesh), Caraibi (per la popolazione di origine africana), Medio Oriente (in particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Siria, Oman, Qatar, Kuwait, Libano, Egitto)