

ALLEGATO B1
PRINCIPI ATTIVI APPROVATI PER IL TRATTAMENTO DELLE
MALATTIE RARE DERMATOLOGICHE

| Principi attivi approvati | Utilizzi approvati dal Tavolo Tecnico |
|--|--|
| Antibiotici topici | Lichen sclerosus et atrophicus |
| | Dermatite erpetiforme |
| | Pemfigo |
| | Pemfigoide bolloso |
| | Pemfigoide benigno delle mucose |
| | Incontinentia Pigmenti |
| | Malattia di Darier |
| | Epidermolisi bollosa |
| | Ipercheratosi epidermolitica |
| | Ipoplasia focale dermica |
| | Aplasia congenita della cute |
| | Sindrome Kid |
| | Ittiosi congenite |
| | Sindrome di Behçet |
| EEC | |
| Antimicotici topici | Pemfigoide benigno delle mucose |
| | Malattia di Darier |
| | Epidermolisi bollosa |
| | Ittiosi congenite |
| | Sindrome di Behçet |
| Cortisonici topici | Lichen sclerosus et atrophicus |
| | Pemfigo |
| | Pemfigoide bolloso |
| | Pemfigoide benigno delle mucose |
| | Malattia di Darier |
| | Epidermolisi bollosa |
| | Ittiosi congenite |
| | Sindrome di Behçet |
| EEC | |
| Formulazioni a base di ossido di zinco | Malattia di Darier |
| | Pemfigo |
| | Pemfigoide bolloso |
| | Lichen sclerosus et atrophicus |
| Idroxizina cloridrato per os (trattamento sintomatico per il prurito) | Dermatite erpetiforme |
| | Pemfigoide bolloso |
| Cetirizina e Levocetirizina (già in fascia A limitatamente alla nota Aifa 89) | Pemfigoide bolloso |
| Topici per afte, inclusi anestetici locali | Sindrome di Behçet |
| Azatioprina | Sindrome di Behçet |
| Colchicina | Sindrome di Behçet |

| | |
|---|---|
| Retinoidi sistemici come Acitretina | Eritrocheratodermia simmetrica progressiva |
| | Eritrocheratodermia variabile |
| | Ipercheratosi epidermolitica |
| | Sindrome di Sjogren-Larsson |
| | Xeroderma pigmentoso |
| | Malattia di Darier |
| | Pachidermoperiostosi |
| | Ittiosi congenite |
| Retinoidi topici (possono includere tretinoina, tazarotene, isotretinoina, a seconda della particolare condizione) | Lichen sclerosus et atrophicus |
| | Eritrocheratodermia simmetrica progressiva |
| | Eritrocheratodermia variabile |
| | Ipercheratosi epidermolitica |
| | Xeroderma pigmentoso |
| Tacrolimus topico | Lichen sclerosus et atrophicus |
| Talidomide | Sindrome di Behçet |
| Dapsone per os | Dermatite erpetiforme |
| Abbigliamento in seta e silicone | Epidermolisi bollosa |
| | Ittiosi congenite (solo nel primo mese di vita) |
| Bende per compressione elastica | Sindrome di Ehlers-Danlos |
| | Sindrome di Maffucci |
| | Sindrome di Klippel Trenaunay |
| Fasciature e retine elastiche per medicazione | Pemfigo |
| | Pemfigoide bolloso |
| | Epidermolisi bollosa |
| Garze di cotone (o di tessuto/non tessuto) | Pemfigo |
| | Pemfigoide bolloso |
| | Epidermolisi bollosa |
| Garze medicate con specifiche caratteristiche limite di composizione | Pemfigo |
| | Pemfigoide bolloso |
| | Epidermolisi bollosa |
| Medicazioni per ulcere con specifiche caratteristiche limite di composizione | Pemfigoide bolloso |
| | Incontinentia Pigmenti |
| | Ittiosi congenite |
| | EEC |
| | Ipercheratosi epidermolitica |
| Medicazioni per ulcere avanzate con specifiche caratteristiche limite di composizione | Epidermolisi bollosa |
| | Ipoplasia focale dermica |
| Cheratolitici con specifiche caratteristiche limite di composizione (includono anche crema all'urea 10-30% e/o vaselina salicilica 5-10-20%, a seconda della particolare condizione) | Sindrome Kid |
| | Malattia di Darier |
| | Sindrome di Sjogren-Larsson |
| | Ittiosi congenite |
| | EEC |
| | Eritrocheratodermia variabile |
| | Ipercheratosi epidermolitica |
| | Eritrocheratodermia simmetrica progressiva |
| Cheratosi follicolare acuminata | |

| | |
|--|--|
| Detergenti con specifiche caratteristiche limite di composizione | Malattia di Darier |
| | Epidermolisi bollosa |
| | Ipercheratosi epidermolitica |
| | Aplasia congenita della cute |
| | Ittiosi congenite |
| | EEC |
| | Eritrocheratodermia simmetrica progressiva |
| Eritrocheratodermia variabile | |
| Emollienti e/o idratanti con specifiche caratteristiche limite di composizione | Epidermolisi bollosa |
| | Ipercheratosi epidermolitica |
| | Aplasia congenita della cute |
| | EEC |
| | Eritrocheratodermia simmetrica progressiva |
| | Eritrocheratodermia variabile |
| | Sindrome di Parry- Romberg |
| | Sindrome Kid |
| | Dermatite erpetiforme |
| | Lichen sclerosus et atrophicus |
| | Pemfigoide benigno delle mucose |
| | Malattia di Darier |
| | Ittiosi congenite |
| Fotoprotettori con specifiche caratteristiche limite di composizione | Epidermolisi bollosa |
| | EEC |
| | Malattia di Darier |
| | Ittiosi congenite |
| | Xeroderma pigmentoso |
| | Discheratosi congenita |
| | Sindrome del nevo displastico |
| | Albinismo |
| | Sindrome di Cockaine |
| Sindrome di Leopard | |
| Vitamina E in specifica formulazione topica | Lichen sclerosus et atrophicus |
| Eosina 2% soluzione acquosa | Pemfigo |