

**FATTORI DI RISCHIO CHE INDICANO ESECUZIONE/RIPETIZIONE DI SCREENING RIPORTATI NELLA “LINEA GUIDA 1/2023 DEL SNLG “GRAVIDANZA FISOLOGICA” (SEZIONE 2) E NELL’APPENDICE X “FATTORI DI RISCHIO PER LE INFEZIONI NELLE DONNE IN GRAVIDANZA”**

**INFEZIONE DA CHLAMYDIA TRACHOMATIS E DA GONOCOCCO**

- Avere età inferiore a 25 anni
- Avere un nuovo partner sessuale negli ultimi 3 mesi
- Avere più di un partner sessuale
- Avere un partner sessuale che ha più di un partner sessuale
- Avere un contatto stretto/convivente/partner sessuale che ha una infezione sessualmente trasmessa (IST)
- Non usare protezioni barriera in modo corretto in una relazione non reciprocamente monogama
- Avere una pregressa o concomitante IST
- Offrire rapporti sessuali in cambio di denaro/droghe

**ALTRI FATTORI DI RISCHIO PER INFEZIONE DA GONOCOCCO**

- Utilizzare droghe
- Essere di etnia afroamericana/nera

**MALATTIA DI CHAGAS (INFEZIONE DA TRYPANOSOMA CRUZI)**

- Essere nate in uno dei 21 Paesi endemici per l'infezione (\*)
- Essere nate da madre proveniente da uno dei 21 Paesi endemici (\*)
- Aver ricevuto trasfusioni di sangue o trapianti in uno dei 21 Paesi endemici
- Aver risieduto in uno dei 21 Paesi endemici (\*) per più di 6 mesi
- Utilizzare droghe endovenose
- Consumare carne poco cotta di animali selvatici o succo di canna da zucchero

(\*) Elenco Paesi endemici (in ordine alfabetico)

Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Guyana francese, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela

**TUBERCOLOSI**

- Provenire da Paesi con incidenza di tubercolosi >100/100.000 (°)
- Avere limitato accesso alle cure
- Essere immunosopresse
- Avere basso livello socioeconomico, instabilità abitativa, difficile accesso ai servizi

- Avere detenzione carceraria propria o del partner
- Avere un contatto stretto/convivente affetto da tubercolosi
- Avere un'infezione da HIV
- Avere il diabete (tipo I e II)

(<sup>o</sup>) Elenco Paesi con incidenza di tubercolosi >100/100.000 (in ordine alfabetico)

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burundi, Cambogia, Cameroon, Chad, Congo, Costa d'Avorio, Djibouti, eSwatini, Etiopia, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Groenlandia, Guinea, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Haiti, India, Indonesia, Isole Marshall, Kenya, Kiribati, Kirgizstan, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nigeria, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Perù, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Repubblica Unita di Tanzania, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica Africa, Sudan del Sud, Thailandia, Timor-Leste, Tuvalu, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.