

L. R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI  
 INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

**SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO**
**POLLO COMUNE BOLOGNESE RER A 029**

<b>POLLO</b>		
<b>Famiglia:</b> <i>Phasianidae</i>	<b>Genere:</b> <i>Gallus</i>	<b>Specie:</b> <i>gallus</i>
<b>Ordine:</b> <i>Galliformi</i>		
<b>Nome comune:</b> Nostrana Bolognese	<b>Codice iscrizione Registro nazionale:</b>	
<b>Sinonimi accertati:</b> Bolognese Collo Nudo, Bolognese a cinque dita, (Bologna)		
<b>Sinonimie errate:</b>		
<b>Rischio di erosione genetica o di estinzione</b>		
Stato sconosciuto    Minacciata conservata.....Minacciata    Critica conservata.....Critica X		
<b>Denominazioni dialettali locali</b> gallina nostrale		
Data inserimento nel repertorio:		
<b>Accessioni valutate</b>	<b>N. riproduttori</b>	<b>Anno d'insediamento</b>
Az. Agr. Taddia e collegate	50 circa	
Az. Agr. Serpieri Bologna	20 circa	
Az. Agr. Sabattini	30 circa	
<b>Luoghi di conservazione ex situ:</b>		
<b>Modalità di conservazione ex situ</b>		
Conservativo (in vivo)		
Allevamento produttivo (in vivo)		
Conservazione dinamica (seme, oociti, cellule somatiche, embrioni, DNA in vitro)		
Conservazione statica (seme, oociti, cellule somatiche, embrioni, DNA in vitro)		
<b>Modalità di conservazione in situ/ on farm-Descrizione</b>		
Allevamento conservativo amatoriale X		
Allevamento produttivo X		
<b>Nostrana Bolognese</b>	<b>Nostrana Bolognese</b>	
		

*Nostrana Bolognese variante collo nudo*



*Nostrana Bolognese variante collo nudo*



*Nostrana Bolognese variante collo nudo*



*Nostrana Bolognese Variante collo nudo*



*Nostrana Bolognese variante cinque dita*



*Particolare del carattere genetico pentadattilo*



### **CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE**

Gli aspetti morfologici della razza la collocano nella classe delle razze ovaiole di tipo mediterraneo. Ad una prima analisi si presenta con morfologia simile alla razza della provincia limitrofa di Modena. Sono tuttavia presenti caratteri morfologici e di colorazione solo in parte sovrapponibili.

Tra le razze locali regionali conserva ancora un alto grado di variabilità morfologica inteso come accumulo di varianti su base di mutazione. E' una razza molto longeva e rustica che entusiasma per la sua capacità di sopravvivenza e per la sua indubbia resistenza alle avversità.

E' una ottima ovaiole con una limitata propensione alla cova. La crescita ponderale in condizioni di stabulazione e alimentazione ottimale è rapida e costante, con il raggiungimento del peso di macellazione intorno a 6-7 mesi, se stabulata all'aperto. Produce uova di grandi dimensioni e con il guscio da bianco a crema.

### **ZONA TIPICA DI PRODUZIONE**

Provincia di Bologna. Gli allevamenti di riferimento per le prime segnalazioni sono dislocati nei comuni di Mascarino Venezzano, Castello d'Argile, Pieve di Cento, Castel Maggiore, Sala Bolognese.

### **BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO**

Trattato di avicoltura / Alessandro Ghigi. - Torino : UTET, 1968

Pagine sparse di avicoltura : teoria e pratica avicola Pascal, Teodoro F. Battiato editore, 1925

Raccolta di lettere in cui Ghigi cita la popolazione avicola della Provincia di Bologna. Alessandro Ghigi 1925

Testimonianza orale dell'allevatore Taddia Graziano e altri componenti del gruppo allevatori

.....

## DESCRIZIONE MORFOLOGICA

### STANDARD - Aspetto generale e caratteristiche della razza

#### 1 - FORMA

<b>Tronco:</b>	Di forma cilindrica presenta le caratteristiche tipiche del pollo omeosomo, è pertanto da ascrivere a tutti gli effetti al tipo autoctono mediterraneo
<b>Testa:</b>	La testa si presenta di grandezza medio grande, la cresta è sempre semplice di grande sviluppo, eretta nel gallo e ripiegata su un lato della testa nella gallina, specialmente nelle prime fasi della deposizione. La tessitura è media con presenza di fine granulazione. I bargigli sono molto sviluppati e specialmente i galli li presentano di dimensioni superiori alla media. Orecchioni tendenti al bianco giallastro a volte con alcune tracce rosse.
<b>Becco:</b>	Tutti i soggetti oggetto delle osservazioni presentano un becco invariabilmente gialloscreziato a volte di bruno
<b>Occhi:</b>	Gli occhi grandi e vivaci sono di colore bruno arancio.
<b>Faccia:</b>	Ben rossa e priva di increspature eccessive.
<b>Collo:</b>	Di lunghezza medio corto, armonico presenta una folta mantellina. Nella variante collo nudo la mantellina è assente. Il collo risulta coperto da pelle ben pigmentata e fine. Esistono nella popolazione omozigoti ed eterozigoti per il carattere collo nudo
<b>Spalle:</b>	Sono mediamente piuttosto larghe e benarrotondate.
<b>Dorso:</b>	Piuttosto lungo
<b>Ali:</b>	Le ali si presentano ben aderenti al corpo.
<b>Coda:</b>	La coda è sviluppata. Le falciiformi del gallo sviluppate. A volte il portamento della coda risulta un po' basso in linea col dorso.
<b>Petto:</b>	Largo e profondo le masse pettorali non sono eccessivamente sviluppate.
<b>Zampe:</b>	I tarsi mediamente lunghi sono di conformazione piuttosto grossolana con quattro dita, è tuttavia presente una variante di razza pentadattila (carattere dominante) discretamente diffusa nella popolazione. Il colore è invariabilmente giallo intenso con la classica punteggiatura rossastra sul lato esterno. Subisce variazione solo nelle galline sottoposte a lunghi cicli di deposizione.
<b>Pelle:</b>	Il colore della pelle è nella totalità dei soggetti analizzati gialla con variazione di intensità a seconda del regime alimentare.

## 2 – PESI

<b>Maschio:</b>	2,5–3,2 kg
<b>Femmina:</b>	1,9–2,6 kg
<b>Difetti gravi:</b>	Peso troppo basso o troppo alto, aspetto vistosamente difforme dallo standard proposto. Aspetto riconducibile ad ibridi commerciali a collo nudo.

## 3 – PIUMAGGIO

Maschio e Femmina	
<b>Piumaggio in generale:</b>	
<b>Piumino:</b>	
<b>Difetti gravi:</b>	

## IV – COLORAZIONI

Dorata frumento e arancio frumento, bianco, selvatico oro, selvatico arancio, selvatico melanizzato, dorso d'ottone, betulla oro betulla argento.

Uova Bianche non inferiori a 55g

**OSSERVAZIONI E RICONTRI .** Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

**OSSERVAZIONI E RICONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE..** Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

**OSSERVAZIONI E RICONTRI SULL'UTILIZZO.** Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

### **Tecnica di allevamento gestione e riproduzione**

Brado

Mungitura manuale

Mungitura meccanica

Pascolo e stalla

Riproduzione assistita

Riproduzione naturale

Semibrado confinato X

Stabulazione fissa

Stabulazione libera

Stallino

<b>DESCRIZIONE MORFOLOGICA POLLO</b>			
<b>CRESTA forma</b>		<b>CRESTA tessitura</b>	
1 semplice	X	1 con fine granulazione	X
2 rosa con spina lunga		2 perfettamente liscia	
3 rosa con spina corta		3 corrugata	
4 cresta a coppa		<b>CRESTA dentatura</b>	
5 cresta a farfalla		1 grande dentatura	X
6 cresta a cornetti		2 fine dentatura	
7 cresta a pisello		3 dente triangolare	X
8 cresta a mora		4 dente sottile	
9 cresta a cuscinetto		5 dente lungo	
10 cresta a fragola/noce		6 dente corto	
11 cresta a lamina			
12 assenza di cresta			
13 semplice bifida posteriormente			
14 corona			
<b>ORECCHIONI colore</b>		<b>ORECCHIONI dimensioni</b>	
1 bianco puro	X	1 molto grande	X
2 bianco crema	X	2 grande	X
3 bianco giallastro		3 medio	
4 bianco bluastro		4 piccolo	
5 bianco screziato di rosso		5 molto piccolo	
6 rosso screziato di bianco			
7 rosso			
<b>BARGIGLI</b>		<b>FAVORITI</b>	
1 molto grandi	X	1 presenti	
2 grandi	X	2 assenti	X
3 medi		3 accennati	
4 piccoli		4 in forma di ciuffi auricolari	
5 assenti con giogaia			
<b>BARBA</b>		<b>CIUFFO</b>	
1 assente	X	1 rotondeggiante assai espanso	
2 presente		2 di forma piramidale eretto	
3 accennata		3 ciuffo nucale espanso	
4 molto pronunciata		4 ciuffo nucale accennato	
<b>MUTAZIONI PIUME</b>		<b>MUTAZIONI ANATOMICHE</b>	
1 collo nudo omozigote	X	1 pentadattilia	X
2 collo nudo eterozigote	X	2 tarsi calzati	
3 penna riccia		3 tarsi corti	
4 penna setosa		4 garretti d'avvoltoio	
5 coda a crescita continua		5 sperone multiplo	
6 abito eclissale		6 assenza di vertebre coccigee	
7 piumaggio femminilizzato		7 sperone singolo	X
8 penna rigida		8 assenza di sperone	
9 penna morbida	X		

<b>MUTAZIONE COLORE PELLE</b>		<b>MUTAZIONE COLORE IRIDE</b>	
1 bianca rosata		1 aranciata	X
2 bianca paglierina		2 rossastra	X
3 giallastra		3 bianco perlacea	
4 gialla intenso	X	4 bruna	
5 pelle nera		5 nera	
6 carne morata			
7 nero violaceo			
<b>CONFORMAZIONE CORPOREA</b>		<b>LIVREA</b>	
1 razza omeosoma	X	1 monocolore	X
2 razza eterosoma		2 bicolore	X
3 razza mesomorfa		3 con disegno complesso	X
4 razza nana autentica		4 con dimorfismo sex accentuato	X
5 razza nana miniatura		5 senza dimorfismo sex accentuato	
6 razza combattente		6 colorazione classificata	nome:
<b>COLORE GUSCIO UOVA</b>		<b>VELOCITA' DI IMPIUMAMENTO</b>	
1 bianco puro	X	1 molto veloce	
2 bianco giallastro		2 veloce	X
3 leggermente rosato		3 medio	
4 decisamente rosato		4 tardivo	
5 rosso mattone		5 estremamente tardivo	
6 marrone cioccolato		<b>ISTINTO ALLA COVA</b>	
7 verde		1 predisposta alla cova	
8 bluastro		2 non predisposta alla cova	
<b>COLORE TARSI</b>		<b>COLORE DEL BECCO</b>	
1 neri		1 giallo	X
2 grigio piombo		2 roseo	
3 neri pianta gialla		3 grigio piombo	
4 neri pianta rosea		4 corno	
5 rosei	X	5 giallo striato	X
6 rosei grigiastri		6 grigio striato	
7 gialli	X	7 nero	
8 verdi	X	<b>CALZATURA DEL TARSO</b>	
9 maculati		1 nudo	X
10 tigrati		2 leggermente calzato	
11 grigio piombo a pianta rosea		3 calzato	
		4 abbondantemente calzato	