

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Tutte le varianti introdotte per le colture sono valide anche per le colture da seme			
Colture	Avversità	Sostanze attive	Modifiche
Tutte	Varie	Metiram	Eliminata
Tutte	Ragnetto rosso, Acariosi, Eriofide	Clofentezine	Eliminata
Tutte	Diserbo	Benfluralin	Eliminata
Tutte	Diserbo	S.Metalachlor	Eliminata
Tutte	Varie	Acibenzolar-S-methile	Inserita nota" utilizzabile fino al 10/07/2025"
Tutte	Varie	Mepanipyrim	Inserita nota" utilizzabile fino al 20/05/2025"
Tutte	Varie	Dimetomorf	Inserita nota" utilizzabile fino al 20/05/2025"
Tutte	Varie	Spinetoram	Inserita nota" utilizzabile fino al 30/12/2025
Tutte	Varie	Spirotetramat	Inserita nota" utilizzabile fino al 30/10/2025
Tutte	Varie	Spiromesifen	Inserita nota" utilizzabile fino al 31/03/2025
Tutte	Varie	Metribuzin	Inserita nota" utilizzabile fino al 24/11/2025
Tutte	Varie	Tritosulfuron	Inserita nota" utilizzabile fino al 07/11/2025
Tutte	Varie	Abamectina	Inserita nota" Ammesso in coltura protetta"
Tutte (cocomero e zucca escluse)	Varie	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi
Difesa Frutticole			
Actinidia	Marciume del colletto	Metalaxil-M	Eliminata
Actinidia	Muffa grigia	Fludioxonil+Ciprodinil	Portato da 1 a 2 il numero degli interventi
Actinidia	Cimice asiatica, mosca della frutta	Deltametrina	Eliminata
Actinidia	Cimice asiatica	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi
Actinidia	Eulia		Inserita precisazione soglia (vincolo): "Soglia II e III generazione: trattare al superamento di 50 adulti per trappola o con danno ai frutti ".

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Actinidia	Mosca della frutta		Inserita soglia vincolante ¹- “intervenire in presenza delle prime punture fertili” Inserire <u>Monitoraggio</u> si consiglia di monitorare settimanalmente la presenza degli adulti con trappole attrattive a partire da quanto indicato nei Bollettini territoriali; - alla comparsa delle prime catture controllare la presenza di punture fertili; porre particolare attenzione agli appezzamenti colpiti negli anni precedenti; in aziende frutticole miste monitorare la presenza della mosca seguendo la maturazione delle diverse specie. <u>Interventi agronomici</u> -distruggere rapidamente la frutta non commerciale una volta terminata la raccolta
Actinidia	Mosca della frutta	Beauveria bassiana	Inserita
Albicocco	Monilia	Mandestrobin	Inserita “massimo 2 interventi nel limite delle strobilurine”
Albicocco	Nerume delle drupacee	Zolfo	Inserita
Albicocco	Anarsia, Afidi, Mosca della frutta, Cimice asiatica	Acetamiprid	Portato da 2 a 1 intervento
Albicocco	Mosca della frutta	Deltametrina	Inserita “massimo 2 interventi nel limite dei piretroidi”
Albicocco	Mosca della frutta		Eliminato vincolo “Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità, ad eccezione dei prodotti biologici” Inserito <u>Monitoraggio</u> si consiglia di monitorare settimanalmente la presenza degli adulti con trappole attrattive a partire da quanto indicato nei Bollettini territoriali; - alla comparsa delle prime catture controllare la presenza di punture fertili; porre particolare attenzione agli appezzamenti colpiti negli

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

			anni precedenti; in aziende frutticole miste monitorare la presenza della mosca seguendo la maturazione delle diverse specie. <u>interventi agronomici</u> -distruggere rapidamente la frutta non commerciale una volta terminata la raccolta
Albicocco	Capnode	Deltametrina	Inserita “massimo 2 interventi nel limite dei piretroidi”
Albicocco	Cimice asiatica, Afidi, Drosophila	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi
Ciliegio	Monilia	Mandestrobin	Inserita “massimo 2 interventi nel limite delle strobilurine”
Ciliegio	Corineo	Ziram	Modificata vincolo “utilizzabile fino a fine fioritura” con utilizzabile in autunno-inverno fino a fine fioritura”
Ciliegio	Mosca del ciliegio	Attract & Kill Lambdacialotrina	Eliminata
Ciliegio	Afide nero	Tau-fluvalinate	Inserita “massimo 2 interventi nel limite dei piretroidi”
Ciliegio	Afide nero, Cimice asiatica, Drosophila	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi
Ciliegio		Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi
Cotogno	Carpocapsa, Cidia del pesco	Clorantraniliprole	Inserita “massimo 1 intervento”
Cotogno	Cimice asiatica, Afidi	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi
Cotogno	Cimice asiatica, Afidi, Mosca della frutta, Cidia del pesco	Piretrine e piretroidi	Portato da 4 a 5 il numero degli interventi
Cotogno	Afidi, Mosca della frutta, Cimice asiatica	Acetamiprid	Portato da 2 ad 1 intervento
Cotogno	Mosca della frutta	Attract and kill Deltametrina	Inserita
Cotogno	Mosca della frutta		Eliminato vincolo “Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità, ad eccezione dei prodotti biologici” Inserito <u>Monitoraggio</u> si consiglia di monitorare settimanalmente la presenza degli adulti con trappole attrattive a partire da quanto indicato nei Bollettini territoriali; - alla comparsa delle prime catture controllare

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

			la presenza di punture fertili; porre particolare attenzione agli appezzamenti colpiti negli anni precedenti; in aziende frutticole miste monitorare la presenza della mosca seguendo la maturazione delle diverse specie. <u>interventi agronomici</u> -distruggere rapidamente la frutta non commerciale una volta terminata la raccolta
Cotogno	Carpocapsa		Inserita precisazione soglia: I generazione: si consiglia di intervenire seguendo le indicazioni dei Bollettini tecnici territoriali. Successivamente intervenire in caso di catture di adulti o al superamento dello 0,3% frutti bacati in giugno, 0,5% in luglio e 0,8% in agosto da verificare su almeno 500 frutti/ha.
Fragola	Botrite	Isofetamid	Eliminato vincolo” Ammesso solo in pieno campo”
Fragola	Oidio	Cos-Oga	Inserito vincolo “Ammesso solo in coltura protetta”
Fragola in serra	<i>Aphis gossypii</i>	Beauveria bassiana	Inserita
Fragola	Drosophila	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi
Fragola	Afidi, Drosophila	Piretrine e piretroidi	Portato da 1 a 2 il numero degli interventi e ad 1 intervento con lambacialotrina
Kaki	Mosca della frutta		Modificata soglia: eliminato “trattare solo in presenza di ovideposizioni” inserito “intervenire in presenza delle prime punture fertili” Inserito <u>Monitoraggio</u> si consiglia di monitorare settimanalmente la presenza degli adulti con trappole attrattive a partire da quanto indicato nei Bollettini territoriali; - alla comparsa delle prime catture controllare la presenza di punture fertili;

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

			porre particolare attenzione agli appezzamenti colpiti negli anni precedenti; in aziende frutticole miste monitorare la presenza della mosca seguendo la maturazione delle diverse specie. <u>Interventi agronomici</u> -distruggere rapidamente la frutta non commerciale una volta terminata la raccolta
Kaki	Mosca della frutta	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Kaki	Aleurodide " <i>Dialeurodes citri</i> "		Inserita avversità
Kaki	Aleurodide	Sali potassici di acidi grassi	Inserita
Melo	Ticchiolatura	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita
Melo	Ticchiolatura	Fluazinam	Eliminato numero interventi
Melo	Ticchiolatura		Portato il gruppo dithianon captano da 16 a 18 interventi
Melo	Ticchiolatura	Ziram	Inserita "massimo 2 interventi"
Melo	Glomerella (<i>Colletotrichum</i> spp.)		Inserita avversità e note agronomiche -Evitare irrigazioni sovra-chioma -Potatura per arieggiare il frutteto -Trattamenti invernali della lettiera fogliare per ridurre il potenziale di inoculo
Melo	Marciume del colletto	Metalaxil-M	Eliminata
Melo	Carpocapsa		Inserita precisazione soglia: I generazione: si consiglia di intervenire seguendo le indicazioni dei Bollettini tecnici territoriali. Successivamente intervenire in caso di catture di adulti o al superamento dello 0,3% frutti bacati in giugno, 0,5% in luglio e 0,8% in agosto da verificare su almeno 500 frutti/ha.
Melo	Afide lanigero	Pirimicarb	Eliminato numero interventi
Melo	Afide lanigero	Acetamiprid	Inserita

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Melo	Afide grigio, Afide verde, Cimice asiatica, Cidia del pesco, Cicaline, Mosca della frutta	Piretrine e piretroidi	Portato da 4 a 5 il numero degli interventi
Melo	Cicaline	Piretrine	Eliminata
Melo	Mosca della frutta	Attract and kill con Deltametrina	Inserita
Melo	Mosca della frutta		Eliminato vincolo "Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità, ad eccezione dei prodotti biologici" Inserito <u>Monitoraggio</u> si consiglia di monitorare settimanalmente la presenza degli adulti con trappole attrattive a partire da quanto indicato nei Bollettini territoriali; - alla comparsa delle prime catture controllare la presenza di punture fertili; porre particolare attenzione agli appezzamenti colpiti negli anni precedenti; in aziende frutticole miste monitorare la presenza della mosca seguendo la maturazione delle diverse specie. <u>interventi agronomici</u> -distruggere rapidamente la frutta non commerciale una volta terminata la raccolta
Melo	Tingide		Inserita avversità
Melo	Tingide	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Mirtillo	Peronospora (<i>Phytophthora</i> spp.)	Fosfonato di potassio	Inserita
Nocciolo	Oidio del nocciolo		Modificata avversità in <i>Phyllactinia</i> spp.
Nocciolo	Ragnetto rosso	Acequinocyl	Inserita massimo 1 intervento
Nocciolo	Eriofide	Sali potassici di acidi grassi	Inserita
Nocciolo	Cimice asiatica	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi
Nocciolo	Balanino, cimici	Piretrine e piretroidi	Portato il numero di interventi da 3 a 4
Noce	Necrosi apicale bruna		Inserito <i>Fusarium</i> spp. tra gli agenti causali

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Noce	Afidi	Lambda-cialotrina	Inserita “massimo 1 intervento sulla coltura nel limite dei piretroidi”
Noce	Afidi, Cimice asiatica	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi
Noce	Afidi, Cimice asiatica, Carpocapsa	Piretrine e piretroidi	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi
Noce	Erinosi	Sali potassici di acidi grassi	Inserita
Olivo	Cecidomia	Flupyradifurone	Inserita
Pero	Ticchiolatura	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita
Pero	Maculatura bruna	Fludioxonil	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi
Pero	Carpocapsa		Inserita precisazione soglia: I generazione: si consiglia di intervenire seguendo le indicazioni dei Bollettini tecnici territoriali. Successivamente intervenire in caso di catture di adulti o al superamento dello 0,3% frutti bacati in giugno, 0,5% in luglio e 0,8% in agosto da verificare su almeno 500 frutti/ha.
Pero	Cimice asiatica	Piretrine e Piretroidi	Portato da 3 a 4 gli interventi e inserire massimo 2 interventi tau-fluvalinate
Pero	Afide verde	Deltametrina	Inserita massimo 2 interventi nel limite di 4 tra piretrine e piretroidi
Pero	Mosca della frutta		Eliminato vincolo: “Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità, ad eccezione dei prodotti biologici” Inserito: Monitoraggio: - si consiglia di monitorare settimanalmente la presenza degli adulti con trappole attrattive a partire da quanto indicato nei Bollettini territoriali; - alla comparsa delle prime catture controllare la presenza di punture fertili; porre particolare attenzione agli appezzamenti colpiti negli anni precedenti; in aziende frutticole miste monitorare la

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

			presenza della mosca seguendo la maturazione delle diverse specie. Interventi agronomici -distruggere rapidamente la frutta non commerciale una volta terminata la raccolta
Pero	Tingide (<i>Stephanitis pyri</i>)		Inserita avversità
Pero	Tingide	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Pesco	Monilia	Mandestrobin	Inserita “massimo 2 interventi nel limite delle strobilurine”
Pesco	Cancro rameali	Dithianon	Inserita nota “AmMESSO in post-raccolta”
Pesco	Cicaline, Cimice asiatica, Forficula, Tripidi, Afidi	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi
Pesco	Cimice asiatica	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi
Pesco	Mosca della frutta	Attract and kill con Lambdaialotrina	Inserita
Pesco	Mosca della frutta		Eliminato vincolo: “Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità, ad eccezione dei prodotti biologici” Inserito: Monitoraggio: - si consiglia di monitorare settimanalmente la presenza degli adulti con trappole attrattive a partire da quanto indicato nei Bollettini territoriali; - alla comparsa delle prime catture controllare la presenza di punture fertili; porre particolare attenzione agli appezzamenti colpiti negli anni precedenti; in aziende frutticole miste monitorare la presenza della mosca seguendo la maturazione delle diverse specie. Interventi agronomici -distruggere rapidamente la frutta non commerciale una volta terminata la raccolta
Susino	Monilia	Mandestrobin	Inserita “massimo 2 interventi nel limite delle strobilurine”

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Susino	Monilia		Portato a 4 interventi con SDHI sulle varietà tardive con raccolta dopo il 15 agosto
Susino	<i>Cidia funebrana</i>		Modificata soglia indicativa eliminando "I generazione interventi giustificati solo in caso di scarsa allegagione" e inserendo le soglie presenti per la II e III generazione.
Susino	Afidi (<i>Myzus persicae</i>)	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi e avversità
Susino	Cimice asiatica	Piretrine	Inserita nel limite dei piretroidi
Susino	Mosca della frutta		Eliminato vincolo: "Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità, ad eccezione dei prodotti biologici" Inserito: Monitoraggio: - si consiglia di monitorare settimanalmente la presenza degli adulti con trappole attrattive a partire da quanto indicato nei Bollettini territoriali; - alla comparsa delle prime catture controllare la presenza di punture fertili; porre particolare attenzione agli appezzamenti colpiti negli anni precedenti; in aziende frutticole miste monitorare la presenza della mosca seguendo la maturazione delle diverse specie. Interventi agronomici -distruggere rapidamente la frutta non commerciale una volta terminata la raccolta
Vite	Peronospora	Benthiavalicarb	Eliminata
Vite	Peronospora	Folpet, Fluazinam e Dithianon	Portato da 7 a 12 il numero degli interventi
Vite	Peronospora	Cimoxanil	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi
Vite	Oidio	Polisolfuro di calcio	Inserita
Vite	Marciume acido Batteri (<i>Acetobacter</i>); Lievitati (<i>Candida</i> spp. <i>Kloekera</i> spp.)		Inserita avversità e nota "È favorito da lesioni degli acini"

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Vite	Marciume acido	<i>Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Pythium oligandrum, Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii, Cerevisane</i>	Inserita
Vite	Escoriosi	Dithianon+Fosfonato di potassio	Inserita nel limite del gruppo folpet, fluazinam e dithianon e il fosfonato di potassio con i limiti presenti sulla coltura
Vite	Escoriosi	Zolfo	Inserita
Vite	Cicaline, Cocciniglie, Scafoideo, Fillossera	Acetamiprid	Portato da 2 ad 1 intervento
Vite	Cicaline, Scafoideo	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi e indicato il limite di 2 per tau-fluvalinate
Vite	Cicaline	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Vite	Cocciniglie <i>Pseudococcus</i> e <i>Planococcus</i>	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Diserbo Frutticole			
Actinidia	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo “Al massimo 1 applicazione”
Albicocco	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo “Al massimo 1 applicazione”
Albicocco	Diserbo fogliare (post-emergenza infestanti) dicotiledoni.	2,4-D	Inserita
Ciliegio	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo “Al massimo 1 applicazione”
Ciliegio	Diserbo fogliare (post-emergenza infestanti) dicotiledoni	2,4-D	Inserita
Cotogno	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo “Al massimo 1 applicazione”
Kaki	Diserbo fogliare (post-emergenza infestanti) dicotiledoni	Pyraflufen etile	Inserita
Melo	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo “Al massimo 1 applicazione”

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna- 2025

Nocciolo	Diserbo fogliare (post-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Glifosate + 2,4-D	Riportate le sostanze attive singolarmente e inserito vincolo "Al massimo 1 applicazione" per 2,4-D
Nocciolo	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo "Al massimo 1 applicazione"
Noce	Diserbo fogliare (post-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Glifosate + 2,4-D	Riportate le sostanze attive singolarmente e inserito vincolo "Al massimo 1 applicazione" per 2,4-D
Noce	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo "Al massimo 1 applicazione"
Noce	Diserbo fogliare graminacee	Clethodim	Inserita
Olivo	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo "Al massimo 1 applicazione"
Pero	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo "Al massimo 1 applicazione"
Pesco	Diserbo fogliare (post-emergenza infestanti) dicotiledoni	2,4-D	Inserita
Pesco	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo "Al massimo 1 applicazione"
Susino	Diserbo fogliare (post-emergenza infestanti) dicotiledoni	2,4-D	Inserita
Susino	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo "Al massimo 1 applicazione"
Vite	Diserbo residuale (pre-emergenza infestanti) dicotiledoni e graminacee	Clomazone	Inserita con vincolo "Al massimo 1 applicazione"
Difesa Orticole			
Aglione	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Anguria pieno campo	Peronospora	Fosfonato di potassio	Inserita con vincolo "AmMESSO solo in pieno campo in miscela con ametoctradin"
Anguria	Afidi (<i>Aphis gossypii</i>)	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita con vincolo "AmMESSO in coltura protetta"
Asparago	Criocere	Soglia	Eliminata nella soglia "durante i primi 2 anni di impianto"
Asparago	Limacce e chioccioline	Metaldeide-esca	Inserita

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Basilico pieno campo	Peronospora	Fosfonato di potassio	Inserita
Basilico	Afidi, Tripidi	Piretrine e piretroidi	Inserita nel limite di 2 interventi tra piretrine e piretroidi
Basilico	Nottue fogliari	Metossifenozone	Eliminata
Basilico	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Bietola da costa e da foglia	Peronospora	Prodotti rameici	Inserita
Bietola da costa e da foglia in pieno campo	Peronospora	Fosfonato di potassio	Inserita con vincolo “Amnesso solo in pieno campo in miscela con ametoctradin”
Bietola da costa e da foglia in pieno campo	Peronospora	Cimoxanil	Inserita con massimo 3 interventi
Bietola da costa e da foglia	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Bietola da costa e da foglia	Afidi, Nottue fogliari, Miridi	Piretrine e piretroidi	Portate da 2 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi e a 3 il limite tra lambdacialotrina e etofenprox
Bietola da costa e da foglia	Nottue fogliari (<i>Spodoptera spp.</i> , <i>H. armigera</i>)	Metossifenozone	Eliminata
Bietola da costa e da foglia	Nottue fogliari (<i>Spodoptera spp.</i> , <i>H. armigera</i>)	<i>Bacillus thuringiensis</i>	Inserita
Bietola da costa e da foglia	Altica, Mosca minatrice	Acetamiprid	Eliminata
Carota	Elateridi	Cipermetrina	Inserita in alternativa a Lambdacialotrina
Cavoli a foglia	Batteriosi (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>)	Prodotti rameici	Inserita avversità e difesa
Cavolo di bruxelles	Nottue, Cavolaia, Tignola	Clorantraniliprole	Eliminata
Cavoli a testa	Afidi, Altica, Nottue, Cavolaie, Tignola, Aleurodidi, Tentredini	Deltametrina	Eliminata
Cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa	Mosca del cavolo		Inserita avversità Hylemia spp.
Cece	Nottue fogliari (<i>H. armigera</i>)	Clorantraniliprole	Inserita con massimo 2 interventi
Cetriolo coltura protetta	Peronospora	Ametoctradin	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi
Cetriolo coltura protetta	Peronospora	Fosfonato di potassio	Inserita con vincolo “Amnesso solo in coltura protetta in miscela con ametoctradin”
Cetriolo coltura protetta	Oidio	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita con vincolo “Amnesso solo in coltura protetta”
Cetriolo	Sclerotinia	<i>Bacillus subtilis</i>	Eliminata

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Cetriolo	Eriofide (<i>Aculops lycopersici</i>)		Inserita avversità
Cetriolo	Eriofide	Olio minerale, Sali potassici di acidi grassi, Abamectina (serra),	Inserita
Cetriolo coltura protetta	Afidi (<i>Aphis gossypii</i>)	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita con vincolo “Amnesso in coltura protetta”
Cicoria	Peronospora	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita con vincolo “Amnesso solo in pieno campo”
Cicoria	Peronospora		Eliminato il vincolo” al massimo 3 interventi per ciclo colturale e non ammessi interventi tra il 15 giugno e il 31 agosto”
Cicoria	Afidi, Miridi, Nottue fogliari e terricole, Tripidi	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero di interventi tra piretrine e piretroidi
Cicoria	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Cipolla	Peronospora	Cimoxanil	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi “massimo 3 consecutivi”
Cipolla	Peronospora		Inserita <i>peronospora sp.</i>
Cipolla	Tripide	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Fagiolino	Afidi, Nottue fogliari, Tripide, Piralide	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 interventi il numero tra piretrine e piretroidi. Eliminata la nota 4 interventi per le colture di secondo raccolto.
Fagiolino	Afide, Piralide del mais, Nottue fogliari, Tripidi	Cipermetrina	Inserito vincolo “Al massimo 1 intervento”
Fagiolino	Ragnetto rosso	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Fagiolino in coltura protetta	Ragnetto rosso	Fenpiroximate	Inserita
Fagiolo	Afidi, Nottue terricoli e fogliari, Tripide, Piralide, Ragnetto rosso	Piretrine e piretroidi	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi e inserita nel limite di 1 per la cipermetrina
Fagiolo	Piralide, Nottue fogliari	Clorantpriliprole	Inserita con massimo 2 interventi
Fagiolo	Ragnetto rosso	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Indivia riccia e scarola	Peronospora	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita con vincolo “Amnesso solo in pieno campo”
Indivia riccia e scarola	Peronospora		Eliminato il vincolo” al massimo 3 interventi per ciclo colturale”

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Indivia riccia e scarola	Afidi, Miridi, Nottue fogliari, Tripidi	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero di interventi tra piretrine e piretroidi
Indivia riccia e scarola	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Lattuga	Peronospora		Eliminato il vincolo dei 3 e 2 interventi per ciclo colturale
Lattuga pieno campo	Peronospora	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita con vincolo “Amnesso solo in pieno campo”
Lattuga	Afidi, Tripidi, Miridi, Nottue fogliari	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi tra Piretrine e piretroidi. Inserito il limite di 3 interventi per deltametrina Inserito vincolo “Massimo 3 interventi tra lambdacialotrina ed etofenprox” Eliminata la nota “per ciclo”
Lattuga	Nottue fogliari	Metossifenoide	Eliminata
Lattuga	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Lattuga	Afidi, Tripidi	Acetamidrid	Eliminata
Mais dolce	<i>Sesamia spp.</i>		Inserita avversità
Mais dolce	<i>Sesamia spp.</i>	Clorantraniliprole Lambdacialotrina Deltametrina	Inserite con i limiti attualmente presenti nelle norme tecniche della coltura
Melanzana	Peronospora	Fosfonato di potassio	Inserita
Melanzana coltura protetta	Afidi (<i>Aphis gossypii</i>)	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita con vincolo “Amnesso in coltura protetta”
Melanzana	Eriofide	Olio minerale, Sali potassici di acidi grassi, Abamectina (serra)	Inserita avversità e interventi difesa
Melanzana pieno campo	Eriofide	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Melanzana	Nottue fogliari (<i>H. armigera</i> , <i>A. gamma</i> , <i>S. littoralis</i>)	Metossifezonide	Inserito vincolo “Amnesso in coltura protetta”
Melanzana	Chioccioline e limacce	Metaldeide esca e fosfato ferrico	Inserita avversità e difesa
Melone pieno campo	Peronospora	Fosfonato di potassio	Inserita con vincolo “Amnesso solo in pieno campo in miscela con ametoctradin”
Patata	Peronospora	Cimoxanil	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi “Massimo 3 consecutivi”
Patata	Peronospora	Fluazinam	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Patata	Peronospora	Zoxamide	Portato da 4 a 5 il numero degli interventi, "Massimo 3 consecutivi"
Patata	Sclerotinia		Inserita avversità
Patata	Sclerotinia	<i>Coniothyrium minitans</i> , <i>Trichoderma harzianum</i>	Inserita
Patata	Nottue fogliari, Afidi, Dorifora	Deltametrina	Inserita nel limite dei piretroidi
Patata	Afidi, Tignola, Nottue fogliari, Dorifora	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi indicando il limite a 2 tra lambdacialotrina, esfenvalerate, cipermetrina e etofenprox. Riportato etofenprox nel gruppo dei piretroidi
Peperone coltura protetta	Cancrena pedale	Fosfonato di potassio	Inserita
Peperone	Piralide, Tripide, Cimici	Piretrine e piretroidi	Portato da 1 a 2 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi mantenendo il limite di 1 per la lambdacialotrina
Peperone coltura protetta	Nottue fogliari (<i>H. armigera</i> , <i>S. esigua</i>)	Metossifezonide	Inserito vincolo "Amnesso in coltura protetta"
Pisello	Afidi verde e nero, Mamestra	Piretrine e piretroidi	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi e indicato il limite di 2 per tau-fluvalinate
Pomodoro da mensa coltura protetta	Peronospora	Cimoxanil	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi "Massimo 3 consecutivi"
Pomodoro da mensa coltura protetta	Cimici, nottua gialla del pomodoro	Piretrine e piretroidi	Portato da 1 a 2 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi mantenendo il limite a 1 tra lambdacialotrina e etofenprox
Pomodoro da mensa coltura protetta	Tripidi	Formentanato	Inserita con massimo 1 intervento
Pomodoro da mensa coltura protetta	Afidi (<i>Aphis gossypii</i>)	Beauveria bassiana	Inserita
Pomodoro pieno campo	Peronospora	Fosfonato di potassio	Inserita con vincolo "Amnesso solo in miscela con ametoctradin"
Pomodoro pieno campo	Peronospora, Alternaria	Folpet	Inserita con massimo 2 interventi
Pomodoro pieno campo	Alternaria	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita
Pomodoro pieno campo	Cimici, Nottua gialla del pomodoro, Nottue terricole	Piretrine e piretroidi	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi tra piretrine e

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

			piretroidi mantenendo a 2 il limite tra lambdacialotrina, cipermetrina e etofenprox
Pomodoro pieno campo	Nottue gialla (<i>H. armigera</i>)	Metossifezonide	Eliminata
Pomodoro pieno campo	Eriofide	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Prezzemolo	Peronospora	Metalaxil-M	Portato da 1 a 2 il numero degli interventi
Prezzemolo	Peronospora	Rame	Inserita
Prezzemolo pieno campo	Peronospora	Ametoctradin	Inserita con massimo 2 interventi e vincolo “Ammesso solo in pieno campo”
Prezzemolo	Afidi, Nottue fogliari	Piretrine e piretroidi	Portato da 1 a 2 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi mantenendo a 1 la deltametrina
Prezzemolo	Nottue fogliari (<i>Mamestra spp.</i> , <i>S. littoralis</i>)	Metossifezonide	Eliminata
Prezzemolo	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Radicchio pieno campo	Peronospora	Metalaxil-M	Portato da 1 per ciclo colturale a 2 per anno
Radicchio pieno campo	Peronospora	Cerevisane, <i>Bacillus subtilis</i>	Inserita
Radicchio	Peronospora		Eliminato il vincolo “Massimo 3 interventi per ciclo colturale e non ammessi interventi tra il 15 giugno e il 31 agosto”
Radicchio	Peronospora	Mandipropamid	Inserita con 2 interventi/anno In pieno campo; 1 intervento/anno in serra
Radicchio	Marciume basale	Pyraclostrobin + Boscalid	Eliminato “Ammesso solo contro Sclerotinia”
Radicchio	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Rucola pieno campo	Peronospora	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita con vincolo “Ammesso solo in pieno campo”
Rucola	Afidi, Altiche, Nottue fogliari, Tripidi, Miridi, Tentredini, Mosca	Piretrine e piretroidi	Portato a 4 il limite tra piretrine e piretroidi e includere l’etofenprox. Inserito il limite di 2 interventi per etofenprox e 2 per la lambdacialotrina. Eliminato vincolo “per ciclo”
Rucola	Nottue fogliari (<i>Mamestra spp.</i> , <i>A. gamma</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>H. armigera</i>)	Metossifezonide	Eliminata
Rucola	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Scalogno	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Spinacio	Peronospora	<i>Peronospora spp.</i>	Inserita
Spinacio	Peronospora	Cimoxanil	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi
Spinacio pieno campo	Peronospora	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita
Spinacio pieno campo	Peronospora	Fosfonato di potassio	Inserito vincolo “Amnesso solo in pieno campo in miscela con ametoctradin”
Spinacio pieno campo	Peronospora	Ametoctradin	Inserita
Spinacio	Peronospora	Metalaxyl	Eliminata
Spinacio	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Spinacio	Afidi, Nottue fogliari	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi. Inserito il limite di 3 interventi per deltametrina. Inserito vincolo “Massimo 3 interventi tra lambdacialotrina ed etofenprox”
Spinacio	Nottue fogliari (<i>Mamestra spp.</i> , <i>A. gamma</i>)	Metossifezonide	Eliminata
Spinacio	Afidi, Tripidi	Acetamiprid	Eliminata
Zucca	Peronospora	Ametoctradin	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi
Zucca	Peronospora	Cymoxanil	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi
Zucca pieno campo	Peronospora	Fosfonato di potassio	Inserita con vincolo “Amnesso solo in pieno campo”
Zucca coltura protetta	Afidi (<i>Aphis gossypii</i>)	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita con vincolo “Amnesso in coltura protetta”
Zucchini coltura protetta	Peronospora	Ametoctradin	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi
Zucchini	Peronospora	Cymoxanil	Portato da 1 a 2 il numero degli interventi
Zucchini	Peronospora	Cyazofamid	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi
Zucchini coltura protetta	Peronospora	Fosfonato di potassio	Inserita con vincolo “Amnesso solo in coltura protetta in miscela con ametoctradin”
Zucchini coltura protetta	Oidio	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita con vincolo “Amnesso solo in coltura protetta”
Zucchini	Aleurodidi	Piretrine pure	Inserita nel limite di Piretrine e piretroidi

Diserbo colture orticole

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Asparago	Diserbo post-raccolta dicotiledoni	2,4-D	Inserita
Cavoli a infiorescenza	Diserbo post-emergenza e post-trapianto graminacee	Clethodim	Inserita
Fagiolo	Diserbo post-emergenza graminacee	Fluazifop-p-butile	Inserita
Pisello	Diserbo post-emergenza graminacee	Fluazifop-p-butile	Inserita
Difesa colture baby leaf			
Bietolina	Nottue fogliari	Etofenprox	Eliminata
Bietolina	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Bietolina	Afidi, Nottue fogliari	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi
Cicorino e Radicchio da taglio	Afidi, Nottue fogliari	Tau-fluvalinate	Eliminata
Cicorino e Radicchio da taglio	Afidi, Nottue fogliari, Tripidi	Piretrine e piretroidi	Portato da 2 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi. Inserito limite di 2 interventi per lambdacialotrina Eliminato vincolo “per taglio”
Cicorino e Radicchio da taglio	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Cicorino e Radicchio da taglio	Aleurodidi	Lambdacialotrina	Inserita con massimo 2 interventi
Cicorino e Radicchio da taglio	Minatori fogliari	Abamectina	Inserita con nota “Ammesso solo in coltura protetta”
Dolcetta	Peronospora	<i>Bacillus subtilis</i>	Inserita
Dolcetta	Afidi, Nottue fogliari, Tripidi	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi. Inserito limite di 3 interventi per deltametrina. Eliminato vincolo “per ciclo”
Dolcetta	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Dolcetta	Nottue fogliari	Etofenprox	Eliminata
Foglie e germogli di brassica	Afidi, Nottue fogliari, Tripidi, Mosca del cavolo	Piretrine e piretroidi	Portato da 2 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi. Inserito limite di 3 interventi per deltametrina. Eliminato vincolo “per ciclo”
Foglie e germogli di brassica	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna- 2025

Lattughino	Afidi, Nottue fogliari, Tripidi, Miridi	Piretrine e piretroidi	Portato da 2 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi. Inserito limite di 3 interventi per deltametrina. Eliminato vincolo “per ciclo”
Lattughino	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Rucola baby leaf coltura protetta	Oidio	Azoxystrobin	Inserita con massimo 2 interventi tra azoxystrobin e pyraclostrobin
Rucola baby leaf coltura protetta	Afidi, Nottue fogliari, Tripidi, Altica, Miridi, Tentredine, Mosca	Piretrine e piretroidi	Portato da 2 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi. Inserito limite di 3 interventi per deltametrina. Eliminato vincolo “per ciclo”
Rucola baby leaf coltura protetta	Nottue fogliari, Tripidi, Altica, Miridi	Etofenprox	Eliminata
Rucola baby leaf coltura protetta	Nottue fogliari	Metaflumizone	Inserita con 2 interventi
Rucola baby leaf coltura protetta	Tripidi	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Spinacino baby leaf	Botrite	Penthiopyrad	Eliminata
Spinacino baby leaf	Afidi, Nottue fogliari	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi
Spinacino baby leaf	Nottue fogliari	Etofenprox	Eliminata
Difesa Colture erbacee			
Barbabietola da zucchero	Cercospora	Protiokonazolo+Metconazolo	Inserito metconazolo in alternativa al difenconazolo, nel limite degli IBE
Barbabietola da zucchero	Afide nero		Eliminato vincolo al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
Pisello proteico	Peronospora, Antracnosi, Mal bianco	Azoxystrobin, Pyraclostrobin	Eliminato vincolo “per ciclo colturale”
Pisello proteico	Afide verde, nero e Mamestra	Piretroidi	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi e massimo 2 con tau-fluvalinate
Frumento	Septoria, Ruggine, Oidio	Spiroxamina	Portato da 1 a 2 il numero degli interventi e inserita su septoria
Frumento	Septoria, Ruggine, Oidio	Trifloxystrobin	Inserita
Mais	<i>Sesamia spp.</i>		Inserita avversità
Mais	<i>Sesamia spp.</i>	Clorantraniliprole Lambdacialotrina	Inserita con i limiti attualmente presenti nelle norme tecniche della coltura

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

		Deltametrina, Cipermetrina	
Orzo	Elmintosporiosi	Metconazolo	Inserita in alternativa a tebuconazolo e benzovindiflupir
Orzo	Elmintosporiosi	Trifloxystrobin	Inserita
Soia	Ragnetto rosso	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserita
Diserbo Colture erbacee			
Barbabietola da zucchero e da seme	Diserbo	Triflusaluron-metile	Eliminata
Frumento	Diserbo pre-emergenza	Glifosate	Inserito vincolo “in alternativa al pre-semina”
Girasole	Diserbo post-emergenza dicotiledoni	Hauloxifen-metile	Inserita
Girasole	Diserbo pre-emergenza	Glifosate	Inserito vincolo “in alternativa al pre-semina”
Mais	Diserbo post-emergenza dicotiledoni perenni	2,4-D	Inserita con vincolo “Al massimo sul 10% della superficie aziendale destinata a mais” e “In alternativa a MCPA”
Mais	Diserbo post-emergenza dicotiledoni perenni	MCPA	Inserito vincolo “In alternativa a 2,4-D”
Mais	Diserbo post-emergenza	Prosulfuron	Eliminato il vincolo “Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento”
Orzo	Diserbo pre-emergenza	Glifosate	Inserito vincolo “in alternativa al pre-semina”
Pisello proteico	Diserbo post-emergenza graminacee	Fluazifop-p-butile	Inserita
Riso	Infestanti non graminacee	Halosulfuron-metile	Inserita
Riso semina in acqua	Diserbo pre-semina graminacee	Propaquizafop	Inserita
Riso semina in acqua	Diserbo riso crodo	Flufenacet	Inserita
Riso	Giavone ed altre Infestanti	Imazamox	Inserito vincolo” ammesso su tutte le varietà di riso ufficialmente certificate tolleranti agli erbicidi imidazolinoni (ad esempio Clearfield, Full Page, ecc.)
Segale, Triticale	Diserbo pre-emergenza	Glifosate	Inserito vincolo “in alternativa al pre-semina”
Segale, Triticale	Diserbo post-emergenza graminacee	Pinoxaden	Inserita
Segale	Post-emergenza dicotiledoni	Mesosulfuron, Amidosulfuron	Inserite

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

Soia	Diserbo pre-emergenza	Glifosate	Inserito vincolo “in alternativa al pre-semina”
Sorgo	Diserbo pre-emergenza	Glifosate	Inserito vincolo “in alternativa al pre-semina”
Difesa colture da seme			
Bietola portaseme		Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi sulla coltura con i piretroidi mantenendo il limite a 1 tra lambda-cialotrina, cipermetrina, esfenvalerate e etofenprox
Cetriolo da seme	Afide delle cucurbitacee, Cimice asiatica	Piretrine e piretroidi	Portato a 4 il numero degli interventi in coltura protetta
Cicoria da seme	Afidi, Miridi, Nottue fogliari e terricole, Tripidi	Piretrine e piretroidi	Portato da 3 a 4 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi
Cicoria da seme	Tripidi	Etofenprox	Inserita con massimo 2 interventi tra piretrine e piretroidi
Lattuga da seme	Nottue fogliari	Metossifezonide	Eliminata
Prezzemolo da seme	Afidi, Nottue fogliari	Piretrine e piretroidi	Portato da 2 a 3 il numero degli interventi tra piretrine e piretroidi mantenendo a 2 la deltametrina
Prezzemolo da seme	Nottue fogliari (<i>Mamestra spp.</i> , <i>S. littoralis</i>)	Metossifezonide	Eliminata
Ravanello da seme	Oidio	Fluxapiraxad	Inserita con massimo 2 interventi
Diserbo colture da seme			
Carota da seme	Diserbo pre-emergenza dicotiledoni e graminacee	Metobromuron	Inserita
Coriandolo da seme	Diserbo post-emergenza graminacee	Propaquizafop	Inserita
Finocchio da seme	Diserbo pre-emergenza dicotiledoni e graminacee	Metobromuron	Inserita
Prezzemolo da seme	Diserbo pre-emergenza dicotiledoni e graminacee	Metobromuron	Inserita
Soia da seme	Diserbo pre-emergenza dicotiledoni e graminacee	Aclonifen	Inserita con vincolo “Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patate, soia oppure sulla fila di

Proposte di modifica alle norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – Norme difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per l'aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata Emilia Romagna– 2025

			semina (riduzione del 50% della dose)
--	--	--	---------------------------------------

Diserbo Frutticole	n. interventi con i candidati alla sostituzione
Mirtillo	0

Diserbo colture orticole	n. interventi con i candidati alla sostituzione
Fava	1