

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA – FASE DI COLTIVAZIONE
– NORME DIFESA FITOSANITARIA, DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI E DI
IMPIEGO DEI FITOREGOLATORI

MODIFICA ALLE NORME DI COLTURA DIFESA FITOSANITARIA

COLTURE FRUTTICOLE

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Albicocco	Mosca della frutta	Esche attivate con Lufenuron		
Albicocco	Drosophyla suzukii	Interventi agronomici: - Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.		I piretroidi e gli esteri fosforici previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche contro la Drosophyla
Albicocco	Afide verde e Cocciniglie	Spyrotetramat		Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Albicocco	Afidi		Estratto di piretro + Rotenone	
Ciliegio	A. Pulchellana Archips Operoptera	Indoxacarb		
Ciliegio	Drosophyla suzukii	Interventi agronomici: - Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.		Lo Spinosad previsto per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche contro la Drosophyla
Ciliegio	Mosca		Thiametoxan	Il prodotto va limitato al massimo ad 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità ed in alternativa all'Imidacloprid

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Cliegio	Afidi	Neonicotinoidi		Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi all'anno con neonicotinoidi dei quali non più di 1 con lo stesso prodotto
Cliegio	Cocciniglie	Spyrotetramat		Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Fragola	Ragnetto rosso	Amblyseius californicus, 4 - 10 ind/mq		
Fragola	Tripidi	Amblyseius swirskii		
Fragola	Botrite		Mepanipyrin	
Kaki			Piretro	
Melo	Mosca della frutta	Esche attivate con Lufenuron		
Melo	Afide grigio, Afide lanigero, afide verde, Cocciniglie	Spyrotetramat		Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Melo			Mancozeb	
Melo			Pimetrozine	
Melo	Eulia, Pandemis, Archips	Indoxacarb		Al massimo 4 interventi all'anno
Melo	Ticchiolatura	Propineb		Nei limiti attualmente previsti per gli altri Ditiocarbammati. Non impegnabile dopo la fioritura.
Noce	Carpocapsa	Nematodi entomopatogeni		
Pero	Ticchiolatura, maculatura	Ditiocarbammati		Autorizzato l'impiego dei ditiocarbammati autorizzati a prescindere dall'epoca di applicazione
Pero	Mosca della frutta	Esche attivate con Lufenuron		
Pero	Ticchiolatura	Propineb		Nei limiti attualmente previsti per gli altri Ditiocarbammati. Non impegnabile dopo la fioritura.
Pero	Afide grigio, Afide lanigero, afide verde, Cocciniglie, Psilla	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Al massimo 1 intervento all'anno contro gli afidi, 1 contro la psilla e 1 contro le cocciniglie. Per la difesa dalla psilla il

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
				prodotto va posizionato sulle uova.
Pero			Mancozeb	
Pero			Pimetrozine	
Pero	Eulia, Pandemis, Archips	Indoxacarb		Al massimo 4 interventi all'anno
Pesco	Mosca della frutta	Esche attivate con Lufenuron		
Pesco	Miridi	Etofenprox		Nei limiti complessivi già previsti per l'utilizzo dell'etofenprox sul pesco
Pesco	Miridi	Inserire l'avversità con soglia: presenza consistente		
Pesco	Afide verde e Cocciniglie	Spyrotetramat		Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Pesco			Pimetrozine	
Pesco	Anarsia	Indoxacarb		Al massimo 4 interventi all'anno
Susino	Mosca della frutta	Esche attivate con Lufenuron		
Susino	Afide verde e Cocciniglie	Spyrotetramat		Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Susino	Tripidi		Ciflutrin	

VITE

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Vite	Botrite		Mepanipyrin	
Vite	Cocciniglie	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno
Vite	Lobesia botrana	Indoxacarb		Al massimo 2 interventi all'anno
Vite	Oidio	Difenconazolo		
Vite	Oidio	Pyraclostrobin	(Pyraclostrobin + Metiram)	Sostituire la miscela con l'impiego del solo Pyraclostrobin
Vite	Peronospora	Propineb		Nei limiti attualmente previsti per gli altri Ditiocarbammati
Vite	Peronospora	Famoxadone		Nei limiti previsti per i QoI
Vite	Varie	Mancozeb		Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità e comunque nei limiti previsti per i ditiocarbammati
Vite	Peronospora	Almisulbrom		Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità e in alternativa alla Cyazofamide
Vite	Muffa grigia	Fluazinam		

COLTURE ORTICOLE

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Anguria	Mal bianco	Ampelomyces quisqualis		
Anguria	Peronospora	Cyazofamide		Al massimo 3 interventi all'anno
Anguria	Nottue fogliari	Indoxacarb		Nel limite di 3 interventi all'anno
Anguria	Mal bianco		Bitertanolo	
Basilico	Peronospora	Azoxystrobin		Eliminare nota "Non ammesso in coltura protetta"
Basilico	Nottue	Chlorantraniliprole + Lambda-cialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno. Tra Etofenprox e Lambdacialotrina al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Non ammesso in coltura protetta
Basilico	Miridi	Etofenprox		Inserire avversità, nei limiti previsti per l'Etofenprox
Basilico	Peronospora	Mandipropamide		Aggiungere nota: Max 4 trattam. anno coltura protetta e 8 all'anno in pieno campo
Basilico	Fusarium	Stryptomycetes k61		
Basilico	Fusariosi	Trichoderma harzianum		
Bietola da foglia e Costa	Pythium	Propamocarb Modificare limitazione: con Max 2 interventi/ciclo		Il controllo di Pythium in assenza di alternative richiedo possibilità di intervenire più volte
Cavolo Broccolo	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Cavolfiore	Nottue	Clorantraniliprole		Al massimo 2 interventi all'anno, solo in pieno campo
Cavolfiore	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi. Non ammesso in coltura protetta
Cavolfiori	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Cavoli			Beauveria bassiana	
Cavoli a foglia	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 intervento all'anno con Deltametrina.
Cavoli a foglia			Metalaxyl	
Cavoli a infiorescenza	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 intervento all'anno con Deltametrina.
Cavoli a testa	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 intervento all'anno con Deltametrina.

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Cavoli a testa	Nottue e Cavolaia	Etmectina Benzoato		Ammissa solo su Pieris, Plutella e Spodoptera. Al massimo 2 interventi all'anno
Cavoli a Testa	Nottue e Cavolaia	Lufenuron		Aggiungere nota: "Ammissa solo in coltura protetta"
Cavoli a testa	Myzus persicae e Brevicorine brassicae	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cavoli a Testa	Nottue e Cavolaia		Teflubenzuron	
Cavoli a testa in coltura protetta			Cipermetrina	
Cavoli di Bruxelles	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdaialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi. Non ammissa in coltura protetta
Cavoli di Bruxelles			Fluvalinate	
Cavolo a Foglia			Teflubenzuron	
Cavolo a infiorescenza			Teflubenzuron	
Cavolo a testa	Afidi	Deltametrina		
Cavolo a testa	Marciume basale	Thricoderma asperellum		
Cavolo a testa			Teflubenzuron	
Cavolo broccolo	Nottue fogliari, (Mamestra brassicae, Pieris brassicae, Plutella xylostella)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Cavolo bruxelles	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Cavolo cappuccio (verza)	Nottue fogliari, (Mamestra brassicae, Pieris brassicae, Plutella xylostella)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Cavolo cappuccio, verza	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Cavolo rapa	Limacce	Fosfato ferrico		
Cavolo rapa			Teflubenzuron	
Cetriolo	Mal bianco	Ampelomyces quisqualis		

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Cetriolo	Afidi	Chrisoperla carnea		
Cetriolo	Nottue fogliari (Autographa gamma, Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.,)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Cetriolo	Oidio	Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi all'anno
Cetriolo	Peronospora	Famoxadone		Nei limiti previsti per i QoI
Cetriolo	Nematodi	Paecilomices liliacinus		
Cetriolo	Sclerotinia	Thricoderma spp.		
Cetriolo	Afidi	Zetacipermetrina		Nel limite dei piretroidi
Cetriolo	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Cetriolo cp		Pimetrozine		Al massimo 2 interventi all'anno, solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili
Cetriolo c.p.	Ragnetto rosso	Amblyseius californicus		
Cetriolo c.p.	Tripide	Amblyseius swirskii		
Cetriolo cp	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cetriolo pc	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cetriolo pc			Pimetrozine	
Cicoria	Nottue fogliari (Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Cicoria			Pimetrozine	
Cicoria - Insalate	Marciumi basali	Contro questa avversità portare n 3 interventi a ciclo almeno nel periodo autunno invernale. Al momento sono 2		
Cicoria - Insalate	Varie	Lambdacialotrina		Eliminare nota "Non ammesso in coltura protetta"
Cicoria cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cicoria p.c	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Cicoria p.c	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi
Cicoria pc e cp	Tripidi	Lambdacialotrina	Acrinatrina	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Cipolla	Peronospora	CAA		Portare a 4 gli interventi all'anno
Cipolla	Peronospora	QoI		Portare a 3 gli interventi all'anno
Cipolla	Nottue e Mosca		Deltametrina	
Cipolla	Tripidi	Deltametrina		Al massimo 2 interventi all'anno
Cocomero	Ragnetto rosso	Amblyseius californicus		
Cocomero	Nottue fogliari (Autographa gamma, Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.,)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Cocomero	Oidio	Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi all'anno
Cocomero			Pimetrozine	
Cocomero pc	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Endivia riccia cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Endivia scarola cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Erbe fresche	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 1 intervento all'anno con Deltametrina.
Erbe Fresche	Afidi	Imidacloprid		Inserire con nota 1 trattam/anno
Erbe fresche p.c.	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi. Non ammesso in coltura protetta
Fagiolino	Nottue	Clorantraniliprole		Al massimo 2 interventi all'anno
Fagiolino	Vari	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 con Deltametrina
Fagiolino	Muffa Grigia	Pirymetanil		Max 2 - Solo coltura protetta

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Fagiolino	Mosca	Teflutrin		Specificare non ammesso in serra
Fagiolino	Nottue terricole		Deltametrina	
Fagiolino cp	Aphis fabae	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Fagiolo cp	Aphis fabae	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Finocchio	Nottue	Bacillus thuringiensis		
Finocchio	Sclerotinia	Coniuthirium minitans		
Finocchio	Nottue	Spinosad		Nel limite di 3 all'anno
Finocchio	Sclerotinia	Thricoderma		
Indivia riccia	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Indivia riccia			Pimetrozine	
Indivia riccia pc e cp	Tripidi	Lambdacialotrina	Acrinatrina	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Indivia scarola	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Indivia scarola			Pimetrozine	
Indivia Scarola - Insalate	Nottue Fogliari	Etofenprox		Uniformare nota per Etofenprox e Piretroidi: "Al massimo 2 interventi con i Piretroidi" e "1 con Etofenprox" Modificare nota su Nottue Fogliari con: Con Piretroidi al massimo 2 interventi per ciclo colturale indip avv.
Indivia scarola p.c.	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi
Indivia scarola pc e cp	Tripidi	Lambdacialotrina	Acrinatrina	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Invivia riccia p.c.	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi
Lattuga	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Lattuga p.c.	Nottue fogliari (Helicoverpa/E liotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Lattuga p.c.	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
				complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi
Lattuga p.c.	Liriomiza		Beauveria bassiana	
Lattuga Pc	Tripidi	Lambdacialotrina	Acrinatrina	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Lattuga pc.	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Mais dolce	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi
Melanzana	Liriomiza	Acetamiprid		Nel limite dei neonicotinoidi
Melanzana	Ragnetto rosso	Amblyseius californicus		
Melanzana	Aleurodide	Amblyseius swirskii		
Melanzana	Nottue fogliari (Autographa gamma, Helicoverpa/EI iotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Melanzana	Marciumi basali (Sclerotinia)	Thricoderma		
Melanzana	Aleurodide		Imidacloprid	
Melanzana			Teflubenzuron	
Melanzana	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Melanzana cp		Pimetrozine		Al massimo 2 interventi all'anno, solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili
Melanzana cp	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Melanzana pc			Pimetrozine	
Melone	Ragnetto rosso	Amblyseius californicus		
Melone	Oidio	Ampelomyces quisqualis		
Melone	Nottue fogliari (Autographa gamma, Helicoverpa/EI iotis arimigera, Spodoptera spp.),	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Melone	Oidio	Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi all'anno

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Melone	Tracheofusariosi	Trichoderma harzianum		
Melone	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Melone cp		Pimetrozine		Al massimo 1 intervento all'anno, solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili
Melone cp	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Melone pc	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Melone pc			Pimetrozine	
Patata	Peronospora	Cyazofamide		Al massimo 3 interventi all'anno
Patata	Peronospora	Famoxadone		Nei limiti previsti per i QoI
Patata	Peronospora	Propineb		Nei limiti attualmente previsti per gli altri Ditiocarbammati
Patata			Mancozeb	
Patata	Nottue terricole		Deltametrina	
Peperone	Ragnetto rosso	Amblyseius californicus, 4 -10 in/mq		
Peperone	Oidio	Ampelomyces quisqualis		
Peperone	Oidio	Bupirimate		
Peperone	Nottue fogliari (Autographa gamma, Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.) Piralide (Ostrinia nubilalis)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Peperone	Oidio	Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi all'anno
Peperone	Piralide	Emamectina Benzoato		
Peperone	Aleurodidi	Piretrine Naturali		
Peperone	Phytophthora	Streptomyces k61		
Peperone			Teflubenzuron	
Peperone	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Peperone cp	Afidi	Pimetrozine		Al massimo 1 intervento all'anno, solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Peperone cp	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Peperone cp	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Peperone cp			Pimetrozine	
Pisello cp	Aphis fabae	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Pomodoro pc e cp	Peronospora	Propineb		Nei limiti attualmente previsti per gli altri Ditiocarbammati
Pomodoro cp	Nottue fogliari (Autographa gamma, Helicoverpa/Ei iotis arimigera, Spodoptera spp.,)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Pomodoro cp	Peronospora	Dimetomorf + Pyraclostrobin		Nei limiti ed in alternativa a QoI e CAA
Pomodoro cp		Pimetrozine		Al massimo 2 interventi all'anno, solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili
Pomodoro cp	Pythium	Propamocarb + Fosetil AL		Aggiungere avversità Pythium con con nota Max 2 tratt./ciclo
Pomodoro cp	Patogeni tellurici	Trichoderma harzianum		
Pomodoro cp	Oidio	Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi all'anno
Pomodoro cp	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Pomodoro pc	Nottue fogliari (Autographa gamma, Helicoverpa/Ei iotis arimigera, Spodoptera spp.,)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Pomodoro pc e cp	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Pomodoro p.c.	Peronospora	Cyazofamide		Al massimo 3 interventi all'anno
Pomodoro p.c. e c.p.	Peronospora	Cyazofamide		Al massimo 3 interventi all'anno
Pomodoro p.c. e c.p.	Peronospora	Famoxadone		Nei limiti previsti per i QoI
Pomodoro p.c. e c.p.	Botrite		Mepanipyrin	

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Pomodoro p.c. e c.p.			Mancozeb	
Pomodoro pc. e cp	Phytophthora	Streptomyces k61		
Pomodoro pc			Pimetrozine	
Prezzemolo	Nottue fogliari	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 1 intervento all'anno con Deltametrina.
Prezzemolo	Rizottoniosi	Thricoderma		
Prezzemolo	Lepidotteri (Udea ferrugalis)		Bacillus thuringiensis	
Prezzemolo			Clorpropham	
Prezzemolo	Afidi	Acetamiprid		Nel limite dei neonicotinoidi
Prezzemolo	Sclerotinia	Fenhexamide		
Prezzemolo	Alternaria	Metalaxyl-M		Aggiungere "Non ammesso in coltura protetta"
Prezzemolo p.c.	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi. Non ammesso in coltura protetta
Prezzemolo p.c.	Tripidi	Lambdacialotrina	Acrinatrina	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Radicchio	Nottue fogliari (Helicoverpa/E liotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Radicchio	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Radicchio			Pimetrozine	
Radicchio pc	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi
Radicchio cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Radicchio pc e cp	Tripidi	Lambdacialotrina	Acrinatrina	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Ravanello	Nottue	Clorpirifos metyle		Utilizzo in pieno campo
Ravanello	Afidi e Altiche	Deltametrina		Aggiungere con la nota "Non ammesso in coltura protetta"
Ravanello	Limacce	Fosfato ferrico		
Scarola	Nottue fogliari (Helicoverpa/E liotis arimigera,	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
	Spodoptera spp.)			
Sedano			Clorpropham	
Sedano	Mosca del sedano Nottue terricole		Deltametrina	
Sedano	Nottue fogliari	Deltametrina		Nel limite dei piretroidi al massimo 1 intervento all'anno
Spinacio	Varie	Lambdacialotrina		Aggiungere nota "Non ammesso in coltura protetta"
Spinacio	Nottue	Sostituire criteri di intervento nottue fogliari: con "in caso di presenza di focolai"		L'infestazione diffusa ha già causato danni irreversibili
Spinacio	Afidi	Sostituire nei criteri degli afidi: Intervenire con trattamento localizzato o a pieno campo in funzione della... con Intervenire in caso di presenza		L'infestazione diffusa ha già causato danni irreversibili
Spinacio	Nottue		Trattamento giustificato solo sulle colture da industria	Eliminare nota
Tutte - Insalate	Marciumi Basali	Modificare in Contro questa avversità max. 2 tratt./ciclo, 3 per i cicli lunghi		Nei periodi piovosi la coltura è fortemente attaccata nella fase finale del ciclo
Tutte - Insalate	Afidi	Sostituire limitazione d'uso: (1) Con Neonicotinoidi al massimo 3 interventi anno, max. 1 per ciclo, 2 per ciclo oltre i 120 gg. (90 in caso di estirpi anticipati)		
Tutte le colture	Tutte le avversità interessate	Acetamiprid		Aggiungere limitazioni di etichetta ovvero 2 tratt/anno
Tutte le colture	Tutte le avversità interessate	Propamocarb + Fosetil Al		Aggiungere limitazioni di etichetta ovvero 2 tratt/ciclo
Tutte le colture in cui ne è previsto l'impiego	Nematodi		Azadiractina	

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Tutte le colture in cui ne è previsto l'impiego	Nematodi		Azadiractina	
Tutte le colture Prezzemolo, sedano, Basilico, Cicoria, Indivia riccia e scarola Cicoria, radicchio	Tutte le avversità interessate	Fenhexamide		Aggiungere limitazioni di etichetta ovvero 2 tratt/anno per lattughe altre insalate ed Erbe Fresche, 3 tratt. Anno su altre colture
Tutte le colture Prezzemolo, sedano, Basilico, Cicoria, Indivia riccia e scarola Cicoria, radicchio	Afidi	Interventi chimici e/o Soglie		Sostituire l'indicazione presenza diffusa o infestazione generalizzata con "presenza"
Tutte le colture Prezzemolo, sedano, Basilico, Cicoria, Indivia riccia e scarola Cicoria, radicchio	Minatrice fogliare	Interventi chimici e/o Soglie		Sostituire l'indicazione presenza diffusa o infestazione generalizzata con "presenza"
Tutte le colture Prezzemolo, sedano, Basilico, Cicoria, Indivia riccia e scarola Cicoria, radicchio	Nottue	Interventi chimici e/o Soglie		Sostituire criteri di intervento nottue fogliari: con "in caso di presenza di focolai"
Tutte le colture Prezzemolo, sedano, Basilico, Cicoria, Indivia riccia e scarola Cicoria, radicchio	Tripidi	Interventi chimici e/o Soglie		Sostituire l'indicazione presenza diffusa o infestazione generalizzata con "presenza"
Zucca	Nottue fogliari (Autographa gamma, Helicoverpa/EI iotis arimigera, Spodoptera spp.,)	Clorrantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Zucca	Peronospora	Cyazofamide		Al massimo 3 interventi all'anno
Zucca	Oidio	Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi all'anno
Zucca	Afidi		Ciflutrin	
Zucca	Aleurodidi	Etofenprox		Al massimo 1 intervento all'anno
Zucca	Spodoptera e Nottue Fogliari	Indoxacarb		Aggiungere avversità Nottue fogliari e Spodoptera . Al max 3 tratt/anno
Zucchini	Ragnetto rosso	Amblyseius californicus		
Zucchini	Oidio	Ampelomyces quisqualis		
Zucchini	Afide delle cucurbitacee	Chrisoperla carnea Beauveria baussiana		
Zucchini	Nottue fogliari (Autographa gamma, Helicoverpa/EI iotis arimigera, Spodoptera spp.,)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Zucchini	Oidio	Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi all'anno
Zucchini	Afidi	Deltametrina		In alternativa e nei limiti previsti per gli altri piretroidi
Zucchini	Peronospora	Famoxadone		Nei limiti previsti per i QoI
Zucchini	Sclerotinia	Thricoderma		
Zucchini	Peronospora		Fosetyl Al	
Zucchini coltura protetta		Pimetrozine		Al massimo 1 interventi all'anno, solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili
Zucchini cp	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Zucchini pc	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Zucchini pc			Pimetrozine	

COLTURE ORTICOLE PROTETTE PER IV GAMMA

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Bietola da foglie in coltura protetta	Rhizoctonia	Trichoderma harzianum		
Cicorino	Nottue fogliari (Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Cicorino cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cicorino cp	Tripidi	Lambdacialotrina	Acrinatrina	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Cicorino cp	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Cicorino IV gamma	Patogeni tellurici	Trichoderma harzianum		
Cicorino IV gamma	Pythium	Propamocarb + Fosetyl Al		Garantisce migliore efficacia
Cicorino IV gamma	Pythium, Sclerotinia	Trichoderma harzianum		
Dolcetta cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Dolcetta cp	Tripidi	Lambdacialotrina	Acrinatrina	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Dolcetta cp	Botrite		Eliminare: irrigazione per manichetta	
Dolcetta cp	Funghi del terreno	Trichoderma harzianum		
Dolcetta cp	Fusarium	Trichoderma harzianum		
Dolcetta cp	Marciume basale e RHizoctonia	Thricoderma		
Dolcetta cp	Marciume Basale e Rizoctonia		Eliminare: effettuare pacciamature e prosature alte	
Dolcetta cp	Marciume Basale e Rizoctonia	Trichoderma harzianum		
Dolcetta cp	Nottue	Sostituire la nota: Intervenire dopo aver rilevato la presenza diffusa di larve e dei relativi danni iniziali. Con la nota: Intervenire		

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
		dopo aver rilevato la presenza diffusa di larve e dei relativi danni iniziali.		
Dolcetta cp	Nottue fogliari, (Mamestra brassicae, Pieris brassicae, Plutella xylostella)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Dolcetta cp	Pythium	Propamocarb + Fosetil AL		Con limitazione etichetta max. 2 tratt. Ciclo.
Dolcetta cp	Tripidi	Dyghliphus		
Dolcetta cp	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Foglie e germogli di brassica	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Foglie e germogli di brassica cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Foglie e germogli di brassica cp.			Pimetrozine	
Foglie e germogli di Brassica IV gamma	Altica		Deltametrina	
Foglie e germogli di Brassica IV gamma	Altica	Imidacloprid + Ciflutrin		Inserire con limitazioni previste per neonicotinoidi e piretroidi. Sostanza attiva che meglio sostituisce l'esclusione di deltametrina
Foglie e germogli di Brassica IV gamma	Altica	Sostituire infestazioni diffuse. Con: Accertata presenza		L'infestazione diffusa ha già causato danni irreversibili
Lattuga c.p	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Lattuga colt.protetta	Nottue fogliari (Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Lattuga cp	Liriomiza		Beauveria bassiana	
Lattuga cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Lattuga cp	Tripidi	Lambdacialotrina	Acrinatrina	Nei limiti previsti per i Piretroidi

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Lattughino	Marciume basale	Modificare ammesso anziché amesso		
Lattughino colt.protetta	Nottue fogliari (Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Lattughino cp	Liriomiza		Beauveria bassiana	
Lattughino cp	Moria delle piantine (Pythium)	Thricoderma harzianum		
Lattughino cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Lattughino cp	Tripidi	Lambdacialotrina	Acrinatrina	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Lattughino cp			Pimetrozine	
Lattughino cp.	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Lattughino IV gamma	Batteriosi	Sostituire la nota: "Gli interventi per aspersione possono favorire lo sviluppo delle batteriosi"		
Lattughino IV gamma	Botrite e sclerotinia	Fenhexamide		Inserire con limitazione etichetta Max. 2 tratt./anno. Solo per Botrite
Lattughino IV gamma	Elateridi	Zeta-cipermetrina		
Lattughino IV gamma	Marciume basale e Rizoctonia	Sostituire la nota "intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante" con: "Intervenire in caso di accertata presenza nei cicli precedenti"		
Lattughino IV gamma	Minatrice fogliare	realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2 - individui per pianta e per lancio. Eliminare riferimento a numero di individui per pianta		
Lattughino IV gamma	Nottue	Sostituire Infestazione generalizzata. con "in caso di presenza di focolai"		
Lattughino IV gamma	Pythium	Propamocarb+Fosetil Al		

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Lattughino IV gamma	Rizoctonia		Eliminare nota pre-trapianto	
Lattughino IV gamma	Rizoctonia		Eliminare: pre trapianto	
Lattughino IV gamma	Rizoctonia	Pencicuron e Tolclofos		Sostituire nota con: " al massimo 1 intervento per ciclo e solo applicazioni al terreno in assenza di coltura"
Rucola colt.prot.	Nottue fogliari (Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Rucola cp	Altica		Deltametrina	
Rucola cp	Altica	Imidacloprid + Ciflutrin		
Rucola cp	Fusarium	Trichoderma harzianum		
Rucola cp	Minatrice fogliare		Eliminare il riferimento al trapianto	
Rucola cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Rucola cp	Peronospora Phytophthora brassicae			Correggere: (Phytophthora brassicae) con Peronospora parassitica
Rucola cp	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Rucola cp			Pimetrozine	
Rucola cp	Phythium	Thricoderma		
Spinacino IV gamma	Varie		Deltametrina	Sostanza attiva non più autorizzata in coltura protetta
Tutte le colture	Tutte le avversità interessate	Acetamiprid		Aggiungere limitazioni di etichetta ovvero 2 tratt/anno
Tutte le colture	Tutte le avversità interessate	Propamocarb + Fosetil AL		Aggiungere limitazioni di etichetta ovvero 2 tratt/ciclo
Tutte le colture in cui ne è previsto l'impiego	Nematodi		Azadiractina	
Tutte le colture IV gamma	Tripidi	Interventi chimici e/o Soglie		Sostituire l'indicazione presenza diffusa o infestazione generalizzata con "presenza"
Tutte le colture IV gamma	Afidi	Interventi chimici e/o Soglie		Sostituire l'indicazione presenza diffusa o infestazione generalizzata con "presenza"

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Tutte le colture IV gamma	Minatrice fogliare	Interventi chimici e/o Soglie		Sostituire l'indicazione presenza diffusa o infestazione generalizzata con "presenza"
Tutte le colture IV gamma	Nottue	Interventi chimici e/o Soglie		Sostituire criteri di intervento nottue fogliari: con "in caso di presenza di focolai"
Tutte le colture IV gamma	Tutte le avversità interessate	Fenhexamide		Aggiungere limitazioni di etichetta ovvero 2 tratt./anno per lattughe altre insalate ed Erbe Fresche, 3 tratt. Anno su altre colture

COLTURE ERBACEE

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Barbabietola	Cercospora	Azoxystrobin		Al massimo 2 interventi all'anno
Barbabietola da zucchero	Afidi, Cassida, ecc.	Deltametrina		Al max 1 intervento all'anno. Inserire per la difesa dal casside
Barbabietola da zucchero	Cleono	Zetacipermetrina		Nel limite dei piretroidi
Barbabietola da zucchero	Cleono	Zetacipermetrina		Nei limiti previsti per i piretroidi
Barbabietola da zucchero	Mamestra	Indoxacarb		
Barbabietola da zucchero	Mamestra	Zetacipermetrina		Nel limite dei piretroidi
Barbabietola da zucchero	Nottue fogliari	Zetacipermetrina		Nei limiti previsti per i piretroidi
Barbabietola da zucchero	elateridi	Zeta-cipermetrina		Nuova registrazione
Colza	Afidi	Lambdacialotrina		Nel limite dei piretroidi
Colza	Altiche	Lambdacialotrina		Nel limite dei piretroidi
Frumento	Afidi	Fluvalinate		Nel limite di 1 intervento insetticida all'anno
Frumento	Oidio, Ruggine e Fusariosi	Pyraclostrobin		Nei limiti previsti per gli anticrittogamici
Mais	Diabrotica	La rotazione colturale è sufficiente a contenere la diabrotica. In altre situazioni installare trappole cromotropiche gialle e seguire le indicazioni dei bollettini per eventuali trattamenti. Vincolante: Il trattamento si giustifica con catture di 50 adulti settimanali consecutivi per due settimane solo nel caso in cui si preveda la coltura del mais anche nell'anno successivo.		
Mais	Diabrotica	Alfacipermetrina, Ciflutrin, Deltametrina e Lambda-cialotrina		Inserire: Nei limiti complessivi previsti per i Piretroidi. Vietati i trattamenti in fioritura.
Mais	Elateridi	La geodisinfestazione vine autorizzata senza limitazioni quando nella rotazione il mais segue la patata		
Mais	Piralide	Trichogramma		
Mais	Elateridi	Zeta-cipermetrina		
Mais	Piralide	Indoxacarb		Al massimo 2 interventi all'anno
Mais	Piralide	Diflubenzuron		

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Tutte le colture	Nematodi		Azadiractina	

FUNGHI

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Funghi			Deltametrina	

PIOPPO

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Pioppo	Bronzatura		Mancozeb Esaconazolo	
Pioppo	Ruggine	Tetraconazolo	Esaconazolo	
Pioppo	Punterolo	Alfacipermetrina		
Pioppo	Separda	Alfacipermetrina		

COLTURE SEMENTIERE

Sulle colture sementiere vengono introdotte tutte le modifiche previste per le stesse colture destinate alle colture ordinarie.

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Barbabietola	Cercospora	Azoxystrobin		Al massimo 2 interventi all'anno
Barbabietola	Cleono	Zetacipermetrina		Nel limite dei piretroidi
Barbabietola	Mamestra	Indoxacarb		
Barbabietola	Mamestra	Zetacipermetrina		Nel limite dei piretroidi
Barbabietola	elateridi	Zeta-cipermetrina		Nuova registrazione
Cavolfiore	Nottue	Clorantraniliprole		Al massimo 2 interventi all'anno, solo in pieno campo
Cavolo broccolo	Nottue fogliari, (Mamestra brassicae, Pieris brassicae, Plutella xylostella)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Cavolfiore	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi. Non ammesso in coltura protetta
Cavoli a infiorescenza	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 intervento all'anno con Deltametrina.
Cavoli a infiorescenza	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Cavoli	Nottue e Cavolaia		Teflubenzuron	
Cavoli	Nottue e Cavolaia		Lufenuron	
Cavolo a testa	Afidi	Deltametrina		
Cavoli a testa	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 intervento all'anno con Deltametrina.
Cavoli a testa	Nottue e Cavolaia	Emamectina Benzoato		Ammessa solo su Pieris. Al massimo 2 interventi all'anno
Cavoli a testa	Myzus persicae e Brevycorine brassicae	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cavoli a testa in coltura protetta			Cipermetrina	
Cavolo a testa	Marciume basale	Thricoderma asperellum		
Cavolo a testa	elateridi	Zeta-cipermetrina		
Cavolo cappuccio	Nottue fogliari, (Mamestra brassicae, Pieris brassicae, Plutella xylostella)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Cavoli di Bruxelles	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi. Non ammesso in

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
				coltura protetta
Cavoli di Bruxelles			Fluvalinate	
Cavoli			Beauveria bassiana	
Cavoli a foglia	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 intervento all'anno con Deltametrina.
Cetriolo	Afidi	Chrisoperla carnea		
Cetriolo	Afidi	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 interventi all'anno
Cetriolo	Afidi	Lambdacialotrina		Nel limite dei piretroidi
Cetriolo	Afidi	Zetacipermetrina		Nel limite dei piretroidi
Cetriolo	Elateridi	Zeta-cipermetrina		
Cetriolo	Mal bianco	Ampelomyces quisqualis		
Cetriolo	Nottue fogliari (Autographa gamma, Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Cetriolo	Oidio	Cyflufenamid		Al massimo 2 interventi all'anno
Cetriolo	Peronospora	Famoxadone		Nei limiti previsti per i QoI
Cetriolo	Sclerotinia	Thricoderma spp.		
Cetriolo	Myzus persicae e Aphis gossypii	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cetriolo pieno campo			Pimetrozine	
Cicoria	Nottue fogliari (Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Cicoria			Pimetrozine	
Cicoria p.c	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi
Cipolla	Peronospora	CAA		Portare a 4 gli interventi all'anno
Cipolla	Peronospora	QoI		Portare a 3 gli interventi all'anno
Finocchio	Nottue	Bacillus thuringiensis		
Finocchio	Nottue	Spinosad		Nel limite di 3 all'anno
Finocchio	Sclerotinia	Coniuthirium minitans		
Finocchio	Sclerotinia	Thricoderma		
Frumento	Afidi	Fluvalinate		Nel limite di 1 intervento insetticida all'anno
Frumento	Oidio, Ruggine e Fusariosi	Pyraclostrobin		Nei limiti previsti per gli anticrittogamici
Indivia riccia			Pimetrozine	
Indivia scarola			Pimetrozine	
Indivia scarola	Nottue	Clorantraniliprole		Al massimo 2 interventi all'anno

Coltura	Avversità	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
		+ Lambdacialotrina		e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi
Indivia scarola	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Indivia riccia	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi
Lattuga	Elateridi	Zeta-cipermetrina		
Lattuga	Nottue fogliari (Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Lattuga	Varie	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 3 intervento all'anno con Deltametrina.
Prezzemolo	Lepidotteri (Udea ferrugalis)		Bacillus thuringiensis	
Prezzemolo	Nottue fogliari	Deltametrina		Già prevista, prevedere il limite massimo di 1 intervento all'anno con Deltametrina.
Prezzemolo	Rizottoniosi	Thricoderma		
Prezzemolo	Alternaria	Metalaxyl-M		Aggiungere "Non ammesso in coltura protetta"
Prezzemolo	Sclerotinia	Fenhexamide		
Prezzemolo	Nottue	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina		Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei piretroidi. Non ammesso in coltura protetta
Radicchio	Nottue fogliari (Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Radicchio			Pimetrozine	
Ravanello	Afidi e Altiche	Deltametrina		Aggiungere con la nota "Non ammesso in coltura protetta"
Ravanello	Limacce	Fosfato ferrico		
Ravanello	Nottue	Clopirifos metyle		Utilizzo in pieno campo
Scarola	Nottue fogliari (Helicoverpa/Eliotis arimigera, Spodoptera spp.)	Clorantraniliprole		Al massimo due interventi all'anno
Tutte le colture	Tutte le avversità interessate	Propamocarb + Fosetil Al		Aggiungere limitazioni di etichetta ovvero 2 tratt/ciclo
Tutte le colture	Nematodi		Azadiractina	
Tutte le colture	Tutte le avversità interessate	Fenhexamide		Aggiungere limitazioni di etichetta ovvero 2 tratt/anno

MODIFICA ALLE NORME PER IL DISERBO

COLTURE FRUTTICOLE

COLTURA	SOSTANZE ATTIVE	Modifica	DPI 2012	
			% S.A.	DOSE annua (l/ ha)
Tutte le frutticole	Glifosate	Incremento della dose annua	30,4	9,00
Pomacee	MCPA	Ferma restando la dose di impiego vengono tolte le limitazione temporali di impiego		
Vite, melo, pero, pesco, susino, kiwi	Carfentrazone	Aumentata la dose annua da 1 a 2 a 2 l/ha, impiegabile sia come diserbante e/o spollonante	6,45	2,00
Ciliegio	Fluazifop-p-butile	Diserbo garminacee	13,4	dose 2 l/ha all'anno - Al max 1 l/ha per ciascun trattamento
Pesco	Fluazifop-p-butile	Diserbo garminacee	13,4	dose 2 l/ha all'anno - Al max 1 l/ha per ciascun trattamento
Melo	Pendimetalin	Solo impianti in allevamento (3 anni)	38,72	2 l/ha all'anno
Pero	Pendimetalin	Solo impianti in allevamento (3 anni)	38,72	2 l/ha all'anno
Pesco	Pendimetalin	Solo impianti in allevamento (3 anni)	38,72	2 l/ha all'anno
Albicocco	Pendimetalin	Solo impianti in allevamento (3 anni)	38,72	2 l/ha all'anno

COLTURE ORTICOLE, SEMENTIERE E ERBACEE

Coltura	Epoca	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Frumento tenero, duro e Orzo	Post emergenza	Bifenox		Formulati al 48% - 2 L./ha
Bietola da costa, taglio.	Pre semina, Pre emergenza e post emergenza	Metamitron (50%)		Formulati al 50% - 2-3 L./ha
Carota			Clorpropham	
Cavoli A foglia			Fenoxaprop-p-etile	
Cetriolo			Fenoxaprop-p-etile	
Cipolla			Fenoxaprop-p-etile	
Fagiolino			Fenoxaprop-p-etile	
Fagiolino	Post emergenza	Bentazone		Formulati al 87% - 0,75 L./ha
Fagiolo	Post emergenza	Bentazone		Formulati al 87% - 0,75 L./ha
Finocchio			Fenoxaprop-p-etile	
Frumento tenero e duro		(Pyroxsulam + Florasulam)		Formulati al (7,8 + 1,42)% - 0,265 L./ha
Frumento tenero, duro e Orzo, Mais		Tritosulfuron		Formulati al 71,40% - 0,05 L./ha
Lattuga	Pre trapianto e pre emergenza	Pendimetalin		Formulati al 31,7% - 1,5 L./ha
Lattuga e Lattughino			Oxadiazon	
Mais	Diserbo di pre-emergenza	(Flufenacet + Isoxaflutolo)		Formulati al (42,8 + 5,15)% - 1 L./ha
Mais	Diserbo di pre-emergenza			Esclusione dell'obbligo di limitare il pre-emergenza solo come localizzato
Mais			(Pendimetalin + Dicamba)	
Melone			Fenoxaprop-p-etile	
Patata	Diserbo di pre-emergenza	Flufenacet		Formulati al 60% - 0,6 - 0,8 L./ha
Patata		Flufenacet		
Peperone			Fenoxaprop-p-etile	
Pomodoro p.c.			Fenoxaprop-p-etile	
Pomodoro pieno campo	Diserbo di pre-emergenza	Flufenacet		Formulati al 60% - 0,6 - 0,8 L./ha
Prezzemolo	Graminacee e dicotiledoni		Clorprofam	
Riso	Diserbo argini	Pendimetalin		Formulati al 31,7% - 2,5/3 L./ha
Riso			(Fenoxaprop-p-etile)	
Rucola			Propizamide	
Sedano		Pendimetalin		Formulati al 31,7% - 2,5/3

Coltura	Epoca	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
				L./ha
Sedano			Clorpropam	Sostanza attiva revocata sulla coltura
Soia			Oxasulfuron	
Soia	Post emergenza	Bentazone		Formulati al 87% - 0,6/1,1 kg/ha
Sorgo	Post emergenza	Bentazone		Formulati al 87% - 1,1/1,7 kg/ha
Spinacino	Pre emergenza	Cloridazon + Metamitron		Formulati al (25 + 37)% - 2,5/3 L./ha. Nello stesso appezzamento con Cloridazon al massimo 1 volta ogni 3 anni
Spinacio	Pre emergenza	Cloridazon + Metamitron		Formulati al (25 + 37)% - 2,5/3 L./ha. Nello stesso appezzamento con Cloridazon al massimo 1 volta ogni 3 anni
Spinacino	Pre semina e Pre emergenza	Metamitron		Formulati al 50% - 2/3 L./ha.
Spinacio	Pre semina e Pre emergenza	Metamitron		Formulati al 50% - 2/3 L./ha.
Cicoria, Indivia riccia, Scarola e Radicchio			Quizalofop etile isomero D	Eliminare su tutte le insalate tranne radicchio (non esistono prodotti commerciali)
Riso e riso in asciutta		Profoxidim		Formulati al 19,8% - 0,4-0,6 l/ha. Al massimo 1 intervento all'anno solo sul 50% della superficie investita a riso.
Erba medica da seme	Disseccamento in pre-raccolta	Diquat		Formulati al 20,0% - 3,3 l/ha
Patata	Disseccamento in pre-raccolta	Diquat		Formulati al 20,0% - 1 l/ha Solo su cvs raccolte dopo il 20 luglio

PIOPPO

Coltura	Epoca	Prodotto inserito o modificato	Prodotti eliminati	Limitazioni e Note
Pioppo		Glifosate	Glufosinate ammonio	

MODIFICA ALLE NORME PER IL DISERBO – DOSI E CONCENTRAZIONE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI

LE MODIFICHE SONO EVIDENZIATE IN GRIGIO

COLTURE ORTICOLE E SEMENTIERE

SOSTANZE ATTIVE	COLTURA	EPOCA	2011		2012	
			% S.A.	DOSE l o Kg / ha	% S.A.	DOSE l o Kg / ha
Aclonifen	Carota	Pre mergenza	49	2	49,6	2
Aclonifen	Patata	Pre emergenza	49	1,5 - 2	49,6	1,5 - 2
Aclonifen	Pisello	Pre emergenza	49	1,5 - 2	49,6	1,5 - 2
Aclonifen	Pomodoro p.c.	Pre emergenza	49	1,5 - 2	49,6	1,5 - 2
Benfluralin	Dolcetta	Pre semina	19,02	5 - 6	19,2	5 - 6
Benfluralin	Dolcetta	Pre semina	19,02	5 - 6	19,2	5 - 6
Benfluralin	Foglie e germogli di brassica	Pre semina	19,02	5 – 6	19,2	5 – 6
Benfluralin	Rucola c.p.	Pre semina	19,02	5 – 6	19,2	5 – 6
Ciclossidim	Cavoli a Testa	Post trapianto	21	1-1,5	10,9	1,5 - 2,5
Ciclossidim	Cavoli Infiorescenza	Post trapianto	21	0,75 – 1,25	10,9	1,5 - 2,5
Ciclossidim	Cicoria	Post emergenza	21	2	10,9	2 - 3
Ciclossidim	Cicorino c.p.	Post trapianto	10,9	2,5	10,9	2 - 2,5
Ciclossidim	Cipolla	Post emergenza	21	0,75 - 1,25	10,9	0,75 - 1,25
Ciclossidim	Dolcetta	Post emergenza	10,09	3	10,9	2 - 3
Ciclossidim	Dolcetta	Post emergenza	10,09	3	10,9	2 - 3
Ciclossidim	Fagiolino	Post emergenza	21	0,75 - 1,25	10,9	1,5 - 2,5
Ciclossidim	Fagiolo	Post emergenza	21	0,75 - 1,25	10,9	1,5 - 2,5
Ciclossidim	Indivia riccia	Post emergenza	21	2	10,9	2 - 3
Ciclossidim	Indivia scarola	Post emergenza	21	2	10,9	2 - 3
Ciclossidim	Lattuga e Lattughino	Post trapianto	21	0,75 - 1,25	10,9	1,5 - 2,5
Ciclossidim	Lattughino	Post trapianto	10,9	2,5	10,9	1,5 - 2,5
Ciclossidim	Patata	Post emergenza	21	0,75 1,25	10,9	1,5 - 2,5

SOSTANZE ATTIVE	COLTURA	EPOCA	2011		2012	
			% S.A.	DOSE l o Kg / ha	% S.A.	DOSE l o Kg / ha
Ciclossidim	Peperone	Post trapianto	10,9	1,5 - 2,5	10,9	1,5 - 2,5
Ciclossidim	Pomodoro p.c.	Post emergenza	21	0,75 - 1,25	10,9	1,5 - 2,5
Ciclossidim	Porro	Post emergenza	21	1 - 2	10,9	1,5 - 2,5
Ciclossidim	Radicchio	Post emergenza	21	2	10,9	2 - 3
Ciclossidim	Rucola	Post emergenza	21	1 - 1,5	10,9	2 - 3
Ciclossidim	Rucola c.p.	Post emergenza	21	1 - 1,5	10,9	1,5 - 2,5
Ciclossidim	Spinacino	Post emergenza	21	1 - 1,5	10,9	2 - 3
Ciclossidim	Spinacio	Post emergenza	10,9	1,5 - 2,5	10,9	1,5 - 2,5
Clomazone	Carota	Pre mergenza	31,4	0,25 - 0,3	30,74	0,25 - 0,3
Clomazone	Fagiolino	Pre emergenza	36	0,2 - 0,3	30,74	0,2 - 0,3
Clomazone	Fagiolo	Pre emergenza	36	0,2 - 0,3	30,74	0,2 - 0,3
Clomazone	Patata	Pre emergenza	31,4	0,3	30,74	0,3
Clomazone	Peperone	Post trapianto	31,4	0,4 - 0,6	30,74	0,4 - 0,6
Clomazone	Pisello	Pre emergenza	36	0,2 - 0,3	30,74	0,2 - 0,3
Clomazone	Zucchino	Pre emergenza	31,4	0,3	30,74	0,3
Clomazone	Zucchino	Pre trapianto	31,4	0,4 - 0,6	30,74	0,4 - 0,5
Clomazone	Zucchino	Post trapianto	31,4	0,3	30,74	0,40
Clomazone	Finocchio	Pre trapianto e pre emergenza	36	0,30	30,74	0,30
Clorprofam	Cicorino c.p.	Pre emergenza	40,8	4	40,8	4
Clorprofam	Cicorino c.p.	Post trapianto	40,8	4	40,8	4
Clorprofam	Lattuga Lattughino	Post trapianto	40	6	40,8	6
Clorprofam	Cicoria	Post trapianto	40	4	40,8	4
Clorprofam	Indivia riccia	Post trapianto	40	4	40,8	4
Clorprofam	Indivia scarola	Post trapianto	40	4	40,8	4
Clorprofam	Lattughino	Pre emergenza post trapianto	40,8	4	40,8	4
Clorprofam	Porro	Pre emergenza	40	4 - 6	40,8	4 - 6
Clorprofam	Porro	Post trapianto	40	4 - 6	40,8	4 - 6
Clorprofam	Radicchio	Post trapianto	40	4	40,8	4

SOSTANZE ATTIVE	COLTURA	EPOCA	2011		2012	
			% S.A.	DOSE l o Kg / ha	% S.A.	DOSE l o Kg / ha
Dicamba	Asparago	Pre ricaccio e post raccolta	21	0,2 - 0,5	21,2	0,2 - 0,5
Dicamba	Mais dolce	Post emergenza	21	0,5	21,2	0,5
Fenmedifam + Lenacil	Spinacio	Post emergenza	15,9 + 81,48	1-2 + 0.3-0.5	15,9 + 80	1-2 + 0.3-0.5
Flufenacet	Patata	Pre emergenza	60	0,6 - 0,85	60	0,6 - 0,85
Flufenacet	Pomodoro p.c.	Pre trapianto	60	0,6 - 0,85	60	0,6 - 0,85
Ioxinil	Aglio	Post emergenza	33,2	0,1 - 0,6	23	0,15 - 0,85
Ioxinil	Cipolla	Post emergenza	33,2	0,1 - 0,6	23	0,15 - 0,85
Lenacil	Spinacio	Pre semina	81,48	0,5-0,7	80	0,5-0,7
Lenacil	Spinacio	Pre emergenza	81,48	0,4 - 0,8	80	0,4 - 0,8
Oxadiazon	Aglio	Pre emergenza	34,1	1	34,86	1
Oxadiazon	Asparago	Pre ricaccio e post raccolta	34,1	1,5	34,86	1,5
Oxadiazon	Cicoria	Pre trapianto	34,10	1,00	34,86	1,00
Oxadiazon	Finocchio	Pre trapianto e pre emergenza	34,1	1 - 1,5	34,86	1 - 1,5
Oxadiazon	Lattughino	Pre trapianto	25,5	1,5	34,86	1,00
Oxadiazon	Peperone	Pre trapianto	34,1	1,5	34,86	1,5
Oxadiazon	Pomodoro p.c.	Pre trapianto	34,1	1	34,86	1
Oxadiazon	Cavoli Infiorescenza	Pre trapianto	34,1	1,2	34,86	1,2
Oxadiazon	Indivia riccia	Pre semina e pre trapianto	34,1	1,5	34,86	1,5
Oxyfluorfen	Aglio	Post emergenza	22	0,1 - 0,5	44	0,05 - 0,25
Oxifluorfen	Cavoli A foglia	Pre trapianto	23,6	1,5 - 2,5	44	0,7 - 1,3
Oxifluorfen	Cavoli Infiorescenza	Pre trapianto	23,6	1,5 - 2,5	44	0,7 - 1,3
Oxifluorfen	Cavoli Rapa	Pre trapianto	23,6	1,5 - 2,5	44	0,7 - 1,3
Oxifluorfen	Cavolia Testa	Pre trapianto	23,6	1,5-2,5	44	0,7 - 1,3
Oxyfluorfen	Cipolla	Post emergenza	22	0,05 - 0,5	44	0,03 - 0,25
Pendimentalin	Aglio	Pre emergenza	31,7	2 - 3	38,72	2,50
Pendimentalin	Aglio	Post emergenza	31,7	1 - 1,5	38,72	1,50
Pendimentalin	Cavoli Rapa	Pre trapianto	31,7	2 - 3	38,72	2 - 2,5

SOSTANZE ATTIVE	COLTURA	EPOCA	2011		2012	
			% S.A.	DOSE l o Kg / ha	% S.A.	DOSE l o Kg / ha
Pendimentalin	Cipolla	Pre emergenza	31,7	2 - 3	38,72	2,00
Pendimentalin	Cipolla	Post emergenza	31,7	1 - 1,5	38,72	1 - 1,5
Pendimentalin	Pisello	Pre emergenza	31,7	2 - 3	38,72	2 - 2,5
Pendimentalin	Patata	Pre emergenza	31,7	2 - 3	38,72	2,50
Pendimetalin	Carota	Pre emergenza	31,7	2 - 3	38,72	2,50
Pendimetalin	Carota	Post emergenza	31,7	2 - 3	38,72	2,50
Pendimetalin	Cavoli A foglia	Pre trapianto	31,7	2 - 3	38,72	2,50
Pendimetalin	Cavolia Testa	Pre trapianto	31,7	2 - 3	38,72	2,50
Pendimetalin	Cece	Pre emergenza	31,7	2	38,72	1,75
Pendimetalin	Fagiolino	Pre emergenza	31,7	1,5 - 2,5	38,72	1,75
Pendimetalin	Fagiolo	Pre emergenza	31,7	1,5 - 2,5	38,72	1,75
Pendimetalin	Peperone	Pre trapianto	31,7	2 - 3	38,72	2,00
Pendimetalin	Pomodoro p.c.	Pre trapianto	31,7	2 - 3	38,72	1,75
Pendimetalin	Asparago	Pre ricaccio e post raccolta	31,7	2 - 3	38,72	2,50
Pendimetalin	Cavoli Infiorescenza	Pre trapianto	31,7	2 - 3	38,72	2,50
Pendimetalin	Finocchio	Pre trapianto e pre emergenza	31,7	2 - 3	38,72	2,50
Pendimetalin	Finocchio	Post trapianto	31,7	2 - 3	38,72	2,50
Propizamide	Cicorino c.p.	Pre e Post trapianto	35,5	2,5 - 3,5	36	2,5 - 3,5
Propizamide	Dolcetta	Pre semina	36,5	2,5 - 3,5	36	2,5 - 3,5
Propizamide	Dolcetta	Post semina	36,5	2,5 - 3,5	36	2,5 - 3,5
Propizamide	Dolcetta	Pre semina	36,5	2,5 - 3,5	36	2,5 - 3,5
Propizamide	Dolcetta	Post semina	36,5	2,5 - 3,5	36	2,5 - 3,5
Propizamide	Lattuga e Lattughino	Pre trapianto	35,5	2,5 - 3,5	36	2,5 - 3,5
Propizamide	Lattughino	Post semina	36,5	2,5 - 3,5	36	2,5 - 3,5
Propizamide	Lattughino	Pre trapianto	36,5	2,5 - 3,5	36	2,5 - 3,5
Propizamide	Cicoria	Pre trapianto	35,5	3 - 4	36	3 - 4

SOSTANZE ATTIVE	COLTURA	EPOCA	2011		2012	
			% S.A.	DOSE l o Kg / ha	% S.A.	DOSE l o Kg / ha
Propizamide	Indivia riccia	Pre trapianto	35,5	3 - 4	36	3 - 4
Propizamide	Indivia scarola	Pre trapianto	35,5	3 - 4	36	3 - 4
Propizamide	Radicchio	Pre trapianto	35,5	3 - 4	36	3 - 4
Quizalofop p etile isomero D	Cavoli Infiorescenza	Post trapianto	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop p etile isomero D	Cavolia Testa	Post trapianto	5	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Aglio	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Carota	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Cipolla	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Fagiolino	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Melone	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Pisello	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Pomodoro p.c.	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Spinacio	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Zucchini	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
S-Metolaclo	Bietola a costa e da orto	Pre emergenza	87,3	0,50	86,5	0,50
S-Metolaclo	Bietola a foglia cp	Pre emergenza	87,3	0,50	86,5	0,50
S-Metolaclo	Fagiolo	Pre emergenza	86,49	1	86,5	1,00
S-Metolaclo	Spinacino	Pre emergenza	87,3	1 - 1,5	86,5	0,50
S-Metolaclo	Spinacio	Pre emergenza	87,3	1 - 1,5	86,5	0,50
S-Metolaclo	Pomodoro p.c.	Pre trapianto	87,3	1 - 1,5	86,50	1 - 1,5

MODIFICA ALLE NORME PER IL DISERBO – DOSI E CONCENTRAZIONE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI

LE MODIFICHE SONO EVIDENZIATE IN GRIGIO

COLTURE ERBACEE E SEMENTIERE

SOSTANZE ATTIVE	COLTURA	EPOCA	2011		2012	
			% S.A.	DOSE l o Kg / ha	% S.A.	DOSE l o Kg / ha
(Iodosulfuron+Fenoxaprop -p-etile + Mefenpir- dietile)	Frumento	Post emergenza	(0,78 + 6,22 + 2,33)	1,25	(0,79 + 6,32 + 2,37)	1,25
Aclonifen	Girasole	Pre emergenza	49	2	49,6	2
Aclonifen	Girasole	Post emergenza	49	1 - 1,5	49,6	1 - 1,5
Aclonifen	Mais	Pre emergenza	49	1,5 - 2	49,6	1,5 - 2
Aclonifen	Sorgo	Pre emergenza	49	1 - 1,5	49,6	1 - 1,5
Aclonifen	Tabacco	Pre trapianto	49	2,5	49,6	2,5
Clodinafop	Frumento	Post emergenza	22,2	0,2 - 0,25	8,08	0,25 - 0,750
Clomazone	Riso	Pre semina	31,4	1	30,74	1
Clomazone	Riso	Post emergenza	31,4	0,5 - 0,7	30,74	0,5 - 0,7
Clomazone	Riso	Pre semina	31,4	1	30,74	1
Clomazone	Riso	Post emergenza	31,4	0,5 - 0,7	30,74	0,5 - 0,7
Clomazone	Soia	Pre emergenza	31,4	0,25 - 0,30	30,74	0,25 - 0,30
Clomazone	Tabacco	Post trapianto	31,4	0,5	30,74	0,5
Fenoxaprop- p-etile	Colza	Post emergenza	6,77	1 – 1,5	6,7	1,2
Fenoxaprop-p-etile	Barbabietola	Post emergenza	6,77	1 - 1,5	6,7	1,2
Fenoxaprop-p-etile	Girasole	Post emergenza	6,77	1 - 1,5	6,7	1,2
Fenoxaprop-p-etile	Tabacco	Post emergenza	6,77	1 - 1,5	6,7	1,2
Fenoxaprop-p-etile	Soia	Post emergenza	6,77	1 - 1,5	6,7	1,2
Flufenacet + Isoxaflutolo	Mais	Pre emergenza	60	0,80	(48 + 10)	0,7
Flufenacet	Riso	Pre semina	60	0,6 - 0,7	60	0,6 - 0,7
Fluroxipyr	Mais	Post emergenza	17	0,4 - 0,8	17,18	0,6-0,8
Fluroxipyr	Frumento	Post emergenza	17,16	0,8 - 1	17,18	0,8 - 1
Fluroxipyr	Avena segale	Post emergenza	17,16	0,8 - 1	17,18	0,8 - 1
MCPA	Riso	Post emergenza	25	1,5	20	1,4
Oxadiazon	Riso	Pre emergenza	34,1	0,65 - 1,3	34,86	0,65 - 1,3
Oxadiazon (in asciutta)	Riso	Post emergenza	34,1	0,65 - 1,3	34,86	0,65 - 1,3
Oxadiazon	Soia	Pre emergenza	34,1	1,5	34,86	1,5
Pendimetalin	Riso	Pre emergenza	31,7	3 - 4	38,72	2 - 2,5
Penoxsulam	Riso	Post emergenza	2,19	2	2,14	2

SOSTANZE ATTIVE	COLTURA	EPOCA	2011		2012	
			% S.A.	DOSE l o Kg / ha	% S.A.	DOSE l o Kg / ha
Penoxsulam	Riso	Post emergenza	2,19	2	2,14	2
Pethoxamide	Mais	Pre emergenza	60	2	56,6	2
Pethoxamide	Soia	Pre emergenza	60	2	56,6	2
Pinoxaden	Frumento	Post emergenza	10	0,4 - 0,45	9,71	0,4 - 0,45
Profoxidim	Riso	Post emergenza	19,8	0,4-0,6	20,6	0,4-0,6
Profoxidim	Riso	post emergenza	19,8	0,4-0,6	20,6	0,4-0,6
Propizamide	Barbabietola	Post emergenza	35	1 - 1,5	36	4 - 5
Propizamide	Erba medica	Post emergenza	35	4	36	4
Quizalofop etile isomero D	Colza	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Barbabietola	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Girasole	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Soia	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5
Quizalofop-etile isomero D	Erba medica	Post emergenza	4,9	1 - 1,5	4,93	1 - 1,5